

CERTIFICATE OF ANALYSIS

I, responsible QA manager in Iksan Plant, LG Life Sciences Ltd., certify that the product below satisfies WHO guidelines (Part A of the Requirements for Hepatitis B Vaccines Made by Recombinant DNA Techniques).

Product : Euvax-B Injection 1.0mL

Lot No : UVX22001

Manufacturing Date : 04 Feb.2022


Expiry Date : 03 Feb.2025

Test Item	Specification	Result
1. Appearance	Well-dispersed suspension	Satisfactory
2. Sterility	Meet the requirements	Sterile
3. Pyrogen Test	Meet the requirements	Pyrogen-free
4. pH	5.4 ~ 7.4	6.5
5. Abnormal Toxicity	Meet the requirements	Satisfactory
6. Aluminum Content	Not more than 1.25 mg/mL	0.53 mg/mL
7. Protein content	Not more than 40 ug/mL	22 ug/mL
8. Thimerosal	Not more than 0.0115 w/v%	0.0097 w/v%
9. Potency (In-vitro)	Not less than 0.5	0.7

Signature

Name

Date Issued



Hongji LEE

26 Sep.2022

100*275mm(front)

100*275mm(back)

IPM208254-1

Euvax B

VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B, RECOMBINANT

Le vaccin Euvax B est composé de particules hautement purifiées et non infectieuses de l'antigène d'enveloppe du virus de l'hépatite B (AgHBs) adsorbées sur des sels d'aluminium (adjuvant) et conservées avec du thiomersal. C'est un vaccin contre l'hépatite B à ADN recombinant dérivé de l'AgHBs produit grâce à la technologie de l'ADN recombinant dans des cellules de levures (*Saccharomyces cerevisiae*).

Le vaccin est conforme aux normes de l'OMS relatives aux vaccins contre l'hépatite B à ADN recombinant. Aucune substance d'origine humaine n'est utilisée pour la fabrication.

DESCRIPTION

Euvax B est une suspension blanche légèrement opalescente.

COMPOSITION

1 ml de suspension contient :

- Principe actif : AgHBs purifié	20 µg
- Adjuvant : Gel d'hydroxyde d'aluminium (Al)	0,5 mg
- Conservateur : Thiomersal	0,01 mlv %
- Excipients : Phosphate monobasique de potassium, Phosphate dibasique de sodium, Chlorure de sodium.	

INDICATION ET UTILISATION

Immunisation contre l'infection due à tous les sous-types connus du virus de l'hépatite B.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Euvax B est destiné à une injection intramusculaire uniquement.

Une dose pédiatrique (nouveau-nés, nourissons et enfants jusqu'à l'âge de 15 ans inclus) a un volume de 0,5 ml et contient 10 µg d'AgHBs.

Une dose pour adulte (plus de 16 ans) a un volume d'1 ml et contient 20 µg d'AgHBs.

Le schéma de vaccination consiste en trois doses de vaccin administrées selon le calendrier suivant :

- 1^{re} dose : date choisie
- 2^e dose : 1 mois après la première dose
- 3^e dose : 6 mois après la première dose

Dose de rappel : l'OMS ne recommande pas de dose de rappel car il a été montré qu'une primo vaccination avec une série de 3 doses assure une protection pendant au moins 15 ans, même si les sujets vaccinés perdent leurs anticorps protecteurs avec le temps. Cette protection à long terme repose sur la mémoire immunologique qui permet une réponse protectrice anamnésique après exposition au HBV. Cependant, de par le monde, certains programmes de vaccination locaux recommandent actuellement une dose de rappel, ces recommandations devraient être respectées.

Un schéma alternatif de 0, 1 et 2 mois et un rappel à 12 mois peut être appliqué à certaines populations (exemple : les nouveau-nés de mères infectées par le virus de l'hépatite B, les personnes qui ont été ou ont pu être exposées au virus dans un passé proche, les personnes voyageant vers des zones à haut risque).

Une ou plusieurs dose(s) supplémentaire(s) peut(vent) être nécessaire(s) chez les patients en hémodialyse ou souffrant d'un déficit immunitaire dans la mesure où les titres d'anticorps protecteurs (> 10 UI/l) peuvent ne pas être obtenus après la primo-vaccination.

CONTRE-INDICATIONS

Le vaccin contre l'hépatite B est contre-indiqué chez les personnes allergiques à un composant d'Euvax B.

ATTENTION - PRECAUTIONS D'UTILISATION

Précautions générales :

- L'administration d'Euvax B doit être repoussée pour les patients souffrant d'une maladie fébrile aiguë grave.
- Chez les patients souffrant de sclérose en plaques, toute stimulation du système immunitaire peut conduire à une exacerbation des symptômes. Pour ces patients, les bénéfices de la vaccination doivent par conséquent être comparés aux risques de poussée de sclérose en plaques (voir réactions indésirables).
- Il est considéré que la protection par la vaccination ne peut pas être assurée chez les patients chez qui l'hépatite B est latente ou en évolution.

- Comme pour tous les vaccins injectables, un traitement médical approprié doit toujours être assuré rapidement en cas de réactions anaphylactiques rares après la vaccination.

Précautions d'utilisation :

- Agiter avant usage car un fin dépôt blanc avec un surnageant incolore clair peut se former pendant le stockage.
- Euvax B ne doit pas être injecté dans la région fessière et ne doit pas être administré par voie intraveineuse.

Grossesse et allaitement :

- Les effets de l'AgHBs sur le développement du fœtus n'ont pas été évalués. Toutefois, comme pour tous les vaccins à virus inactivés, les risques pour le fœtus sont considérés comme négligeables. Euvax B ne doit être administré pendant la grossesse que si cela est vraiment nécessaire.

- Les effets, sur les nouveau-nés allaités au sein, de l'administration d'Euvax B à leur mère n'ont pas été évalués lors des études cliniques.

REACTIONS INDESIRABLES

Communes :

- Les réactions locales telles qu'un érythème, des douleurs, un œdème ou une faible fièvre sont rares. Ces symptômes disparaissent au bout de 2 jours.

Rares :

- Hyperthermie (supérieure à 38,8°C).
- Réactions générales : malaises, asthénie, maux de tête, nausées, vomissements, étourdissements, myalgie, arthrite.
- Rash cutané et augmentation transitoire des transaminases.

Très rares :

- Une relation de cause à effet n'a pas pu être établie pour les événements de multinévrite, de névrite optique, de paralysie faciale, d'exacerbation de la sclérose en plaques et du syndrome de Guillain-Barré.

STOCKAGE

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver entre + 2°C et + 8°C (dans un réfrigérateur). Ne pas congeler.

PRESENTATIONS

Fiasco 0,5ml x 20 fiocons - fiasco 0,5 ml x 10 fiocons - fiasco 0,5ml x 1 fiasco
Fiasco 1 ml x 20 fiocons - fiasco 1 ml x 10 fiocons - fiasco 1 ml x 1 fiasco
Fiasco 5 ml x 10 fiocons - fiasco 10 ml x 10 fiocons

Date de délivrance : 10.02.2017

HEPATITIS B VACCINE, RECOMBINANT

Euvax B consists of highly purified, non infectious particles of Hepatitis B surface antigen (HBsAg) adsorbed onto aluminum salts as an adjuvant and preserved with thiomersal. It is a recombinant DNA hepatitis B vaccine derived from HBsAg produced by DNA recombinant technology in yeast cells (*Saccharomyces cerevisiae*).

The vaccine meets the WHO requirements for recombinant hepatitis B vaccines. No substances of human origin are used in its manufacture.

DESCRIPTION

Euvax B is a white, slightly opalescent suspension.

COMPOSITION

1 ml of the above vaccine contains :

- Active ingredient : Purified HBsAg	20 µg
- Adjuvant : Aluminum Hydroxide Gel (s Al)	0,5 mg
- Preservative : Thiomersal	0,01 mlv %
- Excipients : Potassium phosphate, monobasic, Sodium phosphate, dibasic, Sodium chloride.	

INDICATION AND USAGE

Immunization against infection caused by all known subtypes of Hepatitis B virus.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Euvax B for intramuscular use only.

One pediatric dose (neonates, infants, and children aged up to and including 15 years of age) is 0.5 ml containing 10 µg of HBsAg.

One adult dose (from 16 years) is 1.0 ml containing 20 µg of HBsAg.

The immunization regimen consists of three doses of vaccine given according to the following schedule:

- 1st dose : at elected date
- 2nd dose : 1 month after the first dose
- 3rd dose : 6 months after the first dose

Booster vaccination: The WHO does not recommend booster vaccination, as it has been shown that 3 dose series of hepatitis B immunisation protects for as long as 15 years, and that a protective anamnestic response occurs after exposure to HBV, even if protective antibodies have been lost over time. However, some local vaccination programmes worldwide currently include a recommendation for a booster dose, and these should be respected.

An alternative 0, 1 and 2 months schedule and a 12 months booster can be used in certain populations (e.g. neonates born from Hepatitis B-infected mothers, someone who has or might have been recently exposed to the virus, certain travelers to high-risk areas). Additional dose(s) of vaccine may be required in hemodialysis or immunodeficient patients since protective antibody titres (> 10 IU/l) may not be obtained after the primary immunization course.

CONTRAINDICATIONS

Hepatitis B vaccine is contraindicated for use in persons with hypersensitivity to any component of Euvax B.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

General precautions :

- The administration of Euvax B should be postponed in patients suffering from acute severe febrile illness.
- In patients suffering from multiple sclerosis, any stimulation of the immune system can induce exacerbation of their symptoms. Therefore, for these patients the benefits of vaccination against Hepatitis B should be weighed against the risks of exacerbation of multiple sclerosis. (see Adverse Reactions).
- It is considered that protection cannot be obtained by vaccination in patients in latent or progressive state of Hepatitis B.
- As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment should always be readily available in case of rare anaphylactic reactions following the administration of the vaccine.

Precautions for usage :

- Shake before administration, since a fine white deposit with a clear colorless supernatant may form during storage.

- Euvax B should not be administered in the gluteal region and it must not be administered intravenously.

Pregnancy and lactation :

- The effect of the HBsAg on foetal development has not been assessed. However, as with all inactivated viral vaccines, the risks to the fetus are considered to be negligible. Euvax B should be used during pregnancy only when clearly needed.
- The effect on breast-fed infants of the administration of Euvax B to their mothers has not been evaluated in clinical studies. No contraindication has been established.

ADVERSE REACTIONS

Common :

- Local reactions such as erythema, pain, swelling or minor fever may rarely occur; these symptoms disappear in 2 days.

Rare :

- Hyperthermia (above 38,8°C).
- Systemic reactions such as malaise, asthenia, headache, nausea, vomiting, dizziness, myalgia, arthritis.
- Skin rash and transient increase of transaminases.

Very rare :

- A causal sequence of cause and effect could not be established for reports of multiple neuritis, optic neuritis, facial paralysis, exacerbation of multiple sclerosis, and Guillain-Barré syndrome.

STORAGE CONDITIONS

Do not exceed the expiry date stated on the external packaging.

Store between + 2° C and +8° C (in a refrigerator). Do not freeze.

PRESENTATIONS

0,5 ml x 20 vials - 0,5 ml x 10 vials - 0,5 ml x 1 vial
1 ml x 20 vials - 1 ml x 10 vials - 1 ml x 1 vial
5 ml x 10 vials - 10 ml x 10 vials

Issuance date : 10.02.2017

VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B, RECOMBINANTE

Euvax B está formado por partículas altamente purificadas no infecciosas de antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) adsorbidos en sales de aluminio como adyuvante y preservados con tioromerol. Es una vacuna de ADN recombinante contra la hepatitis B derivada del HBsAg, producida por una tecnología de ADN recombinante aplicada sobre células de levadura (*Saccharomyces cerevisiae*). La vacuna cumple con las exigencias de la OMS para las vacunas recombinantes contra la hepatitis B. En su elaboración no se utilizan sustancias de origen humano.

DESCRIPCIÓN

Euvax B es una suspensión blanca levemente opalescente.

COMPOSICIÓN

Cada 1 ml de vacuna contiene :

- Principio activo : HBsAg purificado	20 µg
- Adyuvante : Gel de hidróxido de aluminio (Al)	0,5 mg
- Como preservante : Tioromerol	0,01 mlv %
- Excipientes : Fosfato de potasio, monobásico, Fosfato de sodio, dibásico, Cloruro de sodio.	

INDICACIÓN Y USO

Immunización contra la infección causada por todos los subtipos conocidos del virus de la hepatitis B.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Euvax B está destinado exclusivamente al uso intramuscular.

Una dosis pediátrica (recién nacidos, lactantes y niños de hasta 15 años de edad) es 0,5 ml, que contiene 10 µg de HBsAg.

Una dosis adulta (a partir de 16 años) es 1,0 ml, que contiene 20 µg de HBsAg.

El régimen de inmunización consiste en 3 dosis de vacuna administradas en el siguiente calendario:

- 1^{ra} dosis : en la fecha elegida
- 2^{da} dosis : 1 mes después de la primera dosis
- 3^{ra} dosis : 6 meses después de la primera dosis.

Vacunación de refuerzo : la OMS no recomienda una vacunación de refuerzo, puesto que ha sido demostrado que una serie primaria de 3 dosis de la vacuna de hepatitis B protege por lo menos durante 15 años y que además, existe una respuesta anamnésica, luego de una exposición al VHB, aunque los anticuerpos protectores se hayan perdido durante ese lapso de tiempo. Se debe tener en cuenta que algunos programas locales de vacunación, incluyen la recomendación de una dosis de refuerzo, y esto debe ser respetado.

Un calendario alternativo : los 0, 1 y 2 meses con revacunación a los 12 meses puede ser utilizada en determinadas poblaciones (p. ej. recién nacidos de madres con hepatitis B, personas que hayan estado o puedan haber estado recientemente expuestas al virus, viajeros a zonas de alto riesgo).

Una dosis adicional de vacuna puede ser necesaria en pacientes sometidos a hemodilisis o inmunodeficientes cuando no sea posible alcanzar títulos de anticuerpos protectores (> 10 UI/l) después de un ciclo de inmunización primaria.

CONTRAINDICACIONES

La vacuna contra la hepatitis B está contraindicada para personas con hipersensibilidad frente a cualquier componente de Euvax B.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Precauciones generales :

- La administración de Euvax B debe ser postergada en pacientes que sufran de una enfermedad febril severa aguda.
- En pacientes que sufren esclerosis múltiple cualquier estímulo del sistema inmunológico puede inducir la exacerbación de su sintomatología. Por lo tanto, en estos pacientes los beneficios de la vacunación contra la hepatitis B deben ser contrastados con los riesgos de exacerbación de la esclerosis múltiple (ver Reacciones adversas).

- Se considera que la protección no puede alcanzarse con la vacunación de pacientes con un estado latente o progresivo de la hepatitis B.

- Como siempre en el caso de vacunas inyectables, debe tenerse a mano un tratamiento médico apropiado en caso de producirse una de las raras reacciones anafilácticas que pueden seguir a la administración de la vacuna.

Precauciones de uso :

- Agitar antes de la administración por cuando puede formarse durante el almacenamiento un fino depósito blanco con un sobrenadante transparente incoloro.
- Euvax B no debe ser administrado en la región glútea ni debe ser administrado por vía intravenosa.

Embarazo y lactancia :

- El efecto de HBsAg sobre el desarrollo fetal no ha sido evaluado. Sin embargo, como en todas las vacunas antivirales desactivadas, los riesgos para el feto deben ser considerados insignificantes. Euvax B debe ser utilizada durante el embarazo sólo en caso de ser claramente necesario.

- El efecto de administrar Euvax B a las madres sobre sus hijos lactantes no ha sido aún evaluado en estudios clínicos. No ha sido establecido ninguna contraindicación.

REACCIONES ADVERSAS

Comunes :

- Reacciones locales tales como eritema, dolor, hinchazón o fiebre menor pueden ocurrir en raras ocasiones; estos síntomas desaparecen en 2 días.

Raras :

- Hipertermia (por sobre 38,8°C).
- Reacciones sistémicas tales como desfallecimiento, astenia, cefaleas, náuseas, vómitos, mareo, migraña, artritis.
- Rash cutáneo y aumento transitorio de las transaminasas.

Muy rare vez :

- No puede establecerse una secuencia causal de causa y efecto para las menciones de neuritis múltiples, neuritis óptica, parálisis facial, exacerbación de la esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

No sobrepasar la fecha límite de utilización que figura en el envase exterior.

Almacenar entre + 2° C y + 8° C (en refrigerador). No congelar.

PRESENTACIONES

Frasco 0,5 ml x 20 frascos - frasco 0,5 ml x 10 frascos - frasco 0,5 ml x 1 frasco
Frasco 1 ml x 20 frascos - frasco 1 ml x 10 frascos - frasco 1 ml x 1 frasco
Frasco 5 ml x 10 frascos - frasco 10 ml x 10 frascos

Fecha de emisión : 10.02.2017

Fab/Manuf

LG Chem

129, Seokam-ro, Ilsan-si,
Jeollabuk-do, Korea