

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Моніторинг ситуації з туберкульозу в Україні

2023 рік

Київ 2024

Зміст

Методологія	3
Розділ 1. Інформація щодо реєстрації випадків туберкульозу в Україні	3
Графік 1. Розподіл показника захворюваності на туберкульоз (нові випадки та рецидиви) за регіонами України.....	3
Карта 1. Розподіл показника захворюваності на туберкульоз, включаючи його рецидиви, серед усього населення України за 2023 рік (на 100 тисяч населення)	4
Графік 2. Приріст показника захворюваності на туберкульоз, включаючи його рецидиви, серед усього населення України за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком.....	5
Розділ 2. Захворюваність на туберкульоз серед дитячого населення України	5
Карта 2. Показник захворюваності дітей віком 0-14 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви за 2023 рік.	5
Графік 3. Приріст показника захворюваності серед дітей віком 0-14 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви, за 2023 порівняно з 2022 роком.....	6
Карта 3. Показник захворюваності підлітків віком 15-17 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви за 2023 рік.	7
Графік 4. Приріст показника захворюваності серед підлітків віком 15-17 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви, за 2023 порівняно з 2022 роком.....	7
Розділ 3. Захворюваність на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією.....	8
Карта 4. Показник захворюваності на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунodefіциту людини (СНІД) за 2023 рік.	8
Графік 5. Приріст показника захворюваності на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунodefіциту людини (СНІД), за 2023 рік порівняно з 2022 роком.	8
Розділ 4. Бактеріологічне підтвердження туберкульозу.....	9
Рисунок 1. Питома вага бактеріологічно підтверджених випадків легеневого ТБ у 2023 році.....	9
Розділ 5. Охоплення БЦЖ	10
Карта 5. Відсоток охоплення щепленням БЦЖ дітей віком до 1 року.....	10
Розділ 6. Відстеження, систематичний скринінг та профілактичне лікування серед контактних осіб.....	11
Графік 6. Відсоток охоплення скринінгом на ТБ осередкових та близьких контактів з пацієнтами з бактеріологічно підтвердженим ТБ у 2023 році.....	11
Графік 7. Відсоток охоплення профілактичним лікуванням контактів у 2023 році.	11
Підсумки.....	12

Методологія

Представлена інформаційна довідка підготовлена фахівцями відділу статистики та аналізу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» і є зведеною характеристикою основних даних за результатами моніторингу поточної ситуації з туберкульозу в Україні. Основним джерелом інформації, що було використано для підготовки даної довідки є форма статистичної звітності №33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз". Аналіз ґрунтується на порівнянні даних за 2023 рік з аналогічними даними попереднього року для оцінки змін, що відбулися внаслідок масштабного воєнного вторгнення російської федерації на територію України у лютому 2022 року.

Приріст розраховано по формулі $((b-a)/a)*100$, де a – показник захворюваності на 100 тисяч населення за 2022 рік, b – показник захворюваності на 100 тисяч населення за 2023 рік.

Розділ 1. Інформація щодо реєстрації випадків туберкульозу в Україні

За розрахунками ВООЗ, у 2022 році захворюваність на ТБ в Україні знаходилась на рівні 90 випадків на 100 тисяч населення, проте за даними рутинного епіднагляду захворюваність на туберкульоз у 2022 році становила 45,1, у 2023 році 48,4 на 100 тисяч населення. Отже, беручи до уваги розрахунки ВООЗ, в Україні в 2022 та 2023 роках не було виявлено близько 45% випадків ТБ.

Протягом 2018-2023 років захворюваність знизилась на 22,3% (з 62,3 у 2018 році до 48,4 на 100 тисяч населення у 2023 році), при цьому періоді з 2013 по 2023 рік відмічається середнє щорічне зниження захворюваності приблизно на 4% (у Європейському регіоні ВООЗ щорічне зниження становило 5%). Різке падіння виявлення та реєстрації випадків туберкульозу у 2020 році було пов'язане зі значним навантаженням на систему охорони здоров'я та обмеженням доступу населення до отримання певних медичних послуг через пандемію COVID-19. Проте, починаючи з 2021 року спостерігається незначне зростання захворюваності на туберкульоз: на 4,3% у 2021, на 2,5% у 2022 році і на 7,3% у 2023 році.

Графік 1. Розподіл показника захворюваності на туберкульоз (нові випадки та рецидиви) за регіонами України.

Захворюваність на ТБ на 100 тисяч населення (нові випадки та рецидиви)

2018-2023




У 2023 році захворюваність на ТБ склала 48,4 на 100 тисяч населення (нові випадки та рецидиви) та зросла на 7,3% у порівнянні з 2022 роком (45,1 на 100 тисяч населення). Наочно спостерігається вплив військових дій на отримання населенням медичних послуг, що відображається на даних захворюваності у тих областях України, в яких має місце тимчасова окупація частини територій. Найбільші показники захворюваності та ТБ на 100 тисяч населення спостерігаються у Дніпропетровській (86,1), Кіровоградській (92,1) та Одеській (99,6) областях. Найнижчі - у Херсонській (15,2) та Донецькій (16,1). (Карта 1).

Карта 1. Розподіл показника захворюваності на туберкульоз, включаючи його рецидиви, серед усього населення України за 2023 рік (на 100 тисяч населення)

Захворюваність на ТБ на 100 тисяч населення, 2023

(нові випадки та рецидиви)

< 20 20-40 40-60 60-80 ≥ 80




Загальнонаціональний показник захворюваності на ТБ у 2023 році виріс, у порівнянні з 2022 роком, на 7,3%. Зміни варіюють від області до області і залежать від ряду факторів, найбільш вагомим з яких є вплив війни. Не дивлячись на те, що Дніпропетровська область одна із лідерів за показником захворюваності, в регіоні все одно спостерігається спад захворюваності у порівнянні із 2022 роком. Крім того, має місце значне зниження показника захворюваності в Херсонській області (на 47%), що, ймовірно, пов'язано з окупацією та деокупацією частини території та міграційними процесами серед населення регіону. Значне зростання захворюваності на ТБ, - від 30% і вище, спостерігається у Миколаївській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях та м.Києві.

Графік 2. Приріст показника захворюваності на туберкульоз, включаючи його рецидиви, серед усього населення України за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком.

Приріст показника захворюваності на ТБ серед усього населення України за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком.

Нові випадки та рецидиви



Дані по Луганській області відсутні

Розділ 2. Захворюваність на туберкульоз серед дитячого населення України

Зростання кількості захворювань на туберкульоз серед дітей 0-14 років у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році тісно пов'язана з погіршенням епідемічної ситуації серед дорослих. Показник захворюваності на ТБ серед дітей склав 10,4 на 100 тисяч населення (Карта 2).

Абсолютна кількість випадків туберкульозу у дітей віком 0-14 років зросла з 450 до 639 випадків у порівнянні до кількості у минулому році.


Поряд зі збільшенням реєстрації абсолютної кількості нових випадків та рецидивів ТБ, відзначено значне збільшення частки випадків ТБ у дітей віком 0-14 років серед загальної кількості випадків ТБ з 2,4% у 2022 році до 3,2% у 2023 році.

Карта 2. Показник захворюваності дітей віком 0-14 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви за 2023 рік.

Захворюваність на ТБ серед дітей віком 0-14 років на 100 тисяч дитячого населення, 2023

(нові випадки та рецидиви)

■ < 2
 ■ 2-10
 ■ 10-30
 ■ 30-50
 ■ ≥ 50



Дані відсутні


В цілому в Україні відмічається зростання захворюваності серед дітей віком 0-14 років на 40,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року (Графік 2). Це, ймовірно, вказує на збільшення кількості прихованих резервуарів інфекції серед дорослих, які передають інфекцію дітям. Таким чином, при зростанні кількості випадків туберкульозу серед дітей, необхідно посилити заходи щодо виявлення туберкульозу серед усього населення.

Крім того, це може означати, що нові методи діагностики впроваджені і внаслідок цього вдалося виявити випадки туберкульоз серед дітей.

Графік 3. Приріст показника захворюваності серед дітей віком 0-14 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви, за 2023 порівняно з 2022 роком

Приріст показника захворюваності на ТБ серед дітей віком 0-14 років за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком.

Нові випадки та рецидиви



Дані по Луганській області відсутні

Звертає на себе увагу Волинська область, де у минулому році було виявлено 16 дітей, а в цьому році 84 дитини, а також Сумська область, де відмічається зростання з 3-х в минулому році до 20 у 2023 році. Натомість, спостерігається зниження у Чернівецькій (з 8 до 1) та Київській (з 21 до 15) областях. Такий значний ріст кількості випадків туберкульозу серед дітей частково може бути пояснений внутрішнім переміщенням населення внаслідок війни в Україні.


Туберкульоз серед дітей та підлітків є серйозною проблемою для охорони здоров'я, оскільки підвищення захворюваності серед дітей вказує на погіршення епідемічної ситуації в їхньому оточенні. Показник захворюваності серед підлітків склав 16,0 на 100 тисяч відповідного населення (Карта 3), що вище показника серед дітей 0-14 років на 53,8%.

Карта 3. Показник захворюваності підлітків віком 15-17 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви за 2023 рік.

Захворюваність на ТБ серед підлітків віком 15-17 років на 100 тисяч відповідного населення, 2023

(нові випадки та рецидиви)

< 2 2-10 10-30 30-50 ≥ 50




В країні відмічається зростання туберкульозу серед підлітків 15-17 років на 55,3% у порівнянні з 2022 роком. (Графік 3).

Враховуючи, що зростання кількості випадків ТБ серед дітей спостерігається у областях, які менше постраждали від війни, то таке зростання, ймовірно, пов'язане з збільшенням кількості внутрішньо-переміщених осіб. В той час, зменшення випадків у Херсонській, Донецькій, Чернігівській областях пов'язане з відтоком населення.

Графік 4. Приріст показника захворюваності серед підлітків віком 15-17 років на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви, за 2023 порівняно з 2022 роком

Приріст показника захворюваності на ТБ серед підлітків віком 15-17 років за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком.

Нові випадки та рецидиви



Дані по Луганській області відсутні

Розділ 3. Захворюваність на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією


Загальнонаціональний показник захворюваності на ТБ/ВІЛ склав 8,2 на 100 тисяч населення за 2023 рік проти 7,8 на 100 тисяч населення за минулий рік (Карта 4).

Карта 4. Показник захворюваності на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини (СНІД) за 2023 рік.

Захворюваність на ТБ у поєднанні з ВІЛ-інфекцією на 100 тисяч населення, 2023

(нові випадки та рецидиви)

< 3 3–10 10–30 ≥ 30




У 13 регіонах спостерігався невеликий ріст кількості випадків туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб, найбільше зростання показника захворюваності на ТБ/ВІЛ відмічається у Харківській області. В той же час в 11 регіонах спостерігається зниження показника, найбільше у Херсонській області, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, що напряду пов'язане зі зниженням показника захворюваності на ТБ в цьому регіоні внаслідок військових дій та відтоком населення. (Графік 4).

Графік 5. Приріст показника захворюваності на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини (СНІД), за 2023 рік порівняно з 2022 роком.

Приріст показника захворюваності на ТБ у поєднанні з ВІЛ-інфекцією за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком.

Нові випадки та рецидиви/ВІЛ



Дані по Луганській області відсутні

Розділ 4. Бактеріологічне підтвердження туберкульозу

У 2023 році частка лабораторно підтверджених усіх випадків ТБ (нові випадки та рецидиви) варіювалася від 55,4% в Кіровоградській області до 85,8% у Чернівецькій області. Загальнонаціональний показник склав 69,3%.

Питома вага бактеріологічно підтверджених випадків легеневого ТБ – індикаторний показник, ціль якого 90%, визначений у наказі МОЗ України від 19.01.2023 №102 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Туберкульоз»». У 2023 році частка лабораторно підтверджених випадків ТБ серед легеневих форм склала 73,1%. Серед регіонів України тільки у Чернівецькій області досягнуто виконання цього індикатору – 90,1%. Наближена до виконання індикатору частка бактеріологічного підтвердження випадків легеневого ТБ спостерігається у шести областях: Волинській 86,6%, Донецькій 85,1%, Житомирській 81,1%, Закарпатській 87,3%, Львівській 82,1%, Миколаївській 80,2%. Найнижчий показник у Дніпропетровській 66%, Запорізькій 63,9%, Кіровоградській 58,3% та Хмельницькій 65,2 областях. (Рисунок 1).

Для отримання якісних даних цього року до наявних граф форми 33-коротка «підтверджено мазком, культурою», додано до врахування графі - методи Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/XDR, LF-LAM. Таким чином було враховано бактеріологічне підтвердження діагнозу ТБ усіма наявними в Україні методами.

Рисунок 1. Питома вага бактеріологічно підтверджених випадків легеневого ТБ у 2023 році.

Бактеріологічне підтвердження діагнозу легеневого ТБ, 2023

Мікроскопія, молекулярно-генетичні методи, культура (за ф. 33-коротка)

■ Підтверджено ■ Не підтверджено



Розділ 5. Охоплення БЦЖ

У 2023 році рівень охоплення щепленням проти туберкульозу (БЦЖ) серед дітей у віці до 1 року по Україні складає 83,5%. Найвищі відсотки охоплення (більше 90%) спостерігається в 5 областях – Тернопільській (90,5%), Миколаївській (91,4%), Хмельницькій (94,8%), Сумській (96,2%) та Херсонській (96,7%). Низькі відсотки охоплення БЦЖ (менше 80%) у Житомирській (74,7%), Закарпатській (77,7%), Запорізькій (78,8%), Київській (76,7%) та Полтавській (79,7%) областях.


Показник охоплення щепленнями проти туберкульозу дітей у віці старше 1 року складає 37,5%.

Карта 5. Відсоток охоплення щепленням БЦЖ дітей віком до 1 року.

Охоплення щепленнями проти туберкульозу (БЦЖ)

відсоток

< 76 76–80 80–85 85–90 90–95 ≥ 95




Розділ 6. Відстеження, систематичний скринінг та профілактичне лікування серед контактних осіб.

Осередкові та близькі контакти осіб із захворюванням на ТБ мають високий ризик інфікування та подальшого розвитку активної форми ТБ. Згідно національних стандартів та рекомендацій ВООЗ, всі осередкові та близькі контакти пацієнтів з бактеріологічно підтвердженим ТБ мають бути охоплені систематичним скринінгом на ТБ та пройти оцінювання щодо відповідності критеріям для призначення ПЛ ТБІ.

Графік 6. Відсоток охоплення скринінгом на ТБ осередкових та близьких контактів з пацієнтами з бактеріологічно підтвердженим ТБ у 2023 році.

Охоплення систематичним скринінгом на ТБ осередкових та близьких контактів з пацієнтами з бактеріологічно підтвердженим ТБ.


Ціль 100%



Графік 7. Відсоток охоплення профілактичним лікуванням контактів у 2023 році.

Охоплення ПЛ ТБІ контактних осіб у 2023 році.

Відсоток серед тих, кому показане ПЛ ТБІ.



Підсумки

Збройна агресія російської федерації проти України надзвичайно негативно вплинула на всі сфери життя українців. Ця повномасштабна війна росії проти України, яка триває вже майже два роки вплинула, у тому числі, і на погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу. Якщо в 2022 році вплив війни пом'якшувало ще відносне благополуччя 2021 року, то в 2023 році в повній мірі проявилася вся негативна тенденція і наслідки поточної ситуації в країні.

За показником захворюваності на ТБ Україна займає 4 місце в Європейському регіоні. За оцінками експертів, існують ризики суттєвого підвищення рівня захворюваності на туберкульоз, що спостерігається за підсумками аналізу захворюваності на ТБ за 2023 рік. В цілому по країні показник захворюваності на туберкульоз склав 48,4 на 100 тисяч населення. Показник захворюваності на туберкульоз серед дітей 0-14 років склав 10,4 на 100 тисяч дитячого населення. Показник захворюваності на туберкульоз серед дітей 15-17 років склав 16,0 на 100 тисяч підліткового населення. Захворюваність на туберкульоз серед дорослого населення (18+) склала 56,5 на 100 тисяч населення старше 18 років.

Загалом, якщо у 2021 відмічалось зростання захворюваності на туберкульоз на 4,3%, у 2022 році – на 2,5%, то у 2023 році спостерігаємо зростання на 7,3%.

Показник захворюваності на ТБ/ВІЛ склав 8,2 на 100 тисяч населення за 2023 рік. Захворюваність на легеневу форму туберкульозу склала 44,1 на 100 тисяч населення в країні.

У 2023 році питома вага бактеріологічного підтвердження випадків ТБ підвищилась за рахунок використання та включення у звітність нових молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу і становить 73,1% проти 71,5% у 2022 році. Проте, для досягнення цілі у 90% потребує додаткових зусиль та уваги з боку лікарів фтизіатрів та лабораторної мережі.