



**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

НАКАЗ

Львів

**Про впровадження в діяльність
закладів охорони здоров'я алгоритму
медичного сектору локального
міжсекторального маршруту допомоги дітям
та підліткам із розладами, пов'язаними
із вживанням психоактивних речовин (ПАР)**

На виконання Комплексної програми охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення в області, затвердженої розпорядженням начальника обласної державної адміністрації від 05.09.2023 № 795/0/5-23ВА(у редакції змін, внесених розпорядженням від 10.11.2025 № 1504/0/5-25ВА), з метою раннього виявлення, оцінки ризиків, вчасної діагностики та комплексної підтримки дітей і підлітків із розладами, пов'язаними зі вживанням психоактивних речовин та впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я Маршруту комплексної міжсекторальної допомоги (надалі - Маршрут), -

Н А К А З У Ю:

1. Впровадити в роботу алгоритм медичного сектору локального міжсекторального маршруту допомоги дітям та підліткам із розладами пов'язаними зі вживанням психоактивних речовин, на первинному та вторинному (спеціалізованому) рівнях (додаток № 1).
2. Керівникам закладів охорони здоров'я впровадити в діяльність та забезпечити виконання алгоритму медичного сектору локального міжсекторального маршруту допомоги дітям та підліткам із розладами пов'язаними зі вживанням психоактивних речовин, на первинному та вторинному (спеціалізованому) рівнях.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о директора

Вікторія МОЙСЕЙ

АЛГОРИТМ
медичного сектору локального міжсекторального маршруту
допомоги дітям та підліткам із розладами, пов'язаними із вживанням
психоактивних речовин (ПАР) на первинному та вторинному
(спеціалізованому) рівнях

1. На первинному рівні (сімейні лікарі, лікарі-педіатри):

Проводити щорічно скринінг на вживання алкоголю, тютюну та інших психоактивних речовин (ПАР) серед підлітків, зазвичай починаючи з 11 років* — під час планових профілактичних оглядів або за зверненням батьків.

Використовувати короткі скринінгові питання та валідні інструменти для оцінки ризику зловживання ПАР.

За наявності ознак гострого ризику (інтоксикація, передозування, суїцидальні висловлювання, психотичні симптоми, тяжкі поведінкові порушення, синдром відміни) провести первинну оцінку стану та організувати невідкладне скерування відповідно до Керівництва WHO mhGAP.

Надавати інформацію та підтримку відповідно до принципів WHO mhGAP щодо роботи з дітьми, підлітками та їхніми сім'ями.

Інформувати підлітків та їх батьків/опікунів про наслідки вживання алкоголю та інших психоактивних речовин для здоров'я та соціального функціонування.

Сприяти позитивним змінам у поведінці підлітків та їхньому середовищі (сім'я, школа, дозвілля, коло спілкування), не акцентуючи увагу на проблемній поведінці, а на участі в повсякденній змістовній діяльності, гуртках, хобі та заняттях, які є безпечними й допомагають розвивати навички.

Заохочувати батьків або законних представників до активної участі у житті підлітка, зокрема до послідовного інтересу щодо кола спілкування та занять підлітка, а також до встановлення чітких очікувань і меж у повсякденному житті.

2. На вторинному (спеціалізованому) рівні (дитячі психіатри, наркологи, психотерапевти, психологи):

Комплексна діагностика: Проведення повного клінічного огляду дитини дитячими психіатрами та наркологами, які мають відповідну підготовку для роботи з дітьми та підлітками, із використанням діагностичних критеріїв МКХ-11/DSM-5 для визначення:

- наявності та типу розладу, пов'язаного з вживанням психоактивних речовин (епізодичне або регулярне вживання зі шкідливими наслідками; інші порушення, пов'язані зі вживанням ПАР);

- супутніх психічних розладів, які можуть передувати вживанню або бути його наслідком, таких як депресія, тривожні розлади, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, поведінкові розлади, стани, пов'язані зі стресом тощо)

Психотерапевтичне лікування (психотерапевт, психолог):

Призначення та/або проведення ключових психотерапевтичних методів з використанням когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) та мотиваційного інтерв'ю.

Медикаментозна терапія (дитячий психіатр, нарколог):

Призначення медикаментів для лікування супутніх психічних розладів або зменшення потягу до ПАР.

Дезінтоксикаційна терапія спрямована на виведення токсичних речовин з організму в умовах стаціонару (при гострій інтоксикації).

Моніторинг та супровід (дитячий психіатр/нарколог)

Проводить планові огляди для оцінки стійкості ремісії.

Профілактичні програми: Лікар координує участь дитини у програмах профілактики рецидивів (групи підтримки, індивідуальні консультації).