






Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)




Медична інформаційна система MEDSTAR

1. Робота в Медичній інформаційній системі MEDSTAR – Вивантаження інформації

	Необхідна дія	Ілюстрація дії
1.	Відкриваємо MEDSTAR.	
2.	В головному меню, що знаходиться в лівій частині екрана обираємо “Журнали та звіти” , переходимо в “Звіти”	
3.	В меню, що відкрилось, шукаємо “Звітність по пацієнтам” та обираємо “Діагнози”	

Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)

Медична інформаційна система MEDSTAR

4. Для вибору періоду вивантаження натискаємо на позначку фільтру.	 Фільтри Клас захворювань МКХ-10: Оберть зі списку Група захворювань МКХ-10: Оберть зі списку Захворювання МКХ-10: Оберть зі списку Група захворювань ICPC-2: Оберть зі списку Захворювання ICPC-2: Оберть зі списку Дата від: 11.10.2022 Дата до: 11.10.2023
5. В полі “Стовпці”, окрім автоматично запропонованих системою стовпців, обираємо “Захворювання МКХ-10”. Перевіряємо обов’язковість галочки напроти поля “Пацієнт”.	 Стовпці ☐ Група захворювань ☐ Захворювання ☒ Захворювання МКХ-10 ☐ Підрозділ ☐ Лікар ☐ Пацієнт ☐ Вік ☐ Стать ☐ Дата прийому ☐ Роль ☐ Клінічний статус ☐ Вид діагнозу ☐ Суттєвість тяжкості Зберегти
6. Робимо вивантаження, натискаючи кнопку “Експорт”.	 Експорт



Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)

Медична інформаційна система MEDSTAR




2. Робота в отриманому файлі “*Instrument*” microsoft excel

Вивантажені дані мають табличний вигляд як на скріншоті нижче:

	Необхідна дія	Ілюстрація дії
1	Виділяємо весь аркуш, натискаючи на трикутничок правою кнопкою миші, знімаємо всі можливі об'єднання, у випадку якщо поле “Merge & Center”/ “Об'єднати та центрувати” активне. Копіюємо весь аркуш натискаючи “Copy”/ “Копіювати”.	


Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)

Медична інформаційна система MEDSTAR

2	Відкриваємо отриманий файл “Instrument”, на аркуші MEDSTAR натискаємо так само на трикутничок правою кнопкою миші та у вікні, що випадає обираємо “Paste” / “Вставити”	
3	Після того як данні копіюються в інструмент, строки з даними про пацієнтів, що звертались з діагнозами, які вимагали тестування на ВІЛ, будуть виділені синім кольором.	
4	Прибираємо «дублі» в графі пацієнти	
5	Сортуємо будь-яку з активних колонок за кольором виділення. Для цього натискаємо лівою кнопкою миші на стрілочку вниз та в списку, що випадає обираємо	

Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)

Медична інформаційна система MEDSTAR

“Sort by Color” / “Сортування за кольором” і обираємо наш синій;	
5 Виділяємо всі клітинки блакитні в стовпчику «Коди ICPC» і бачимо в правому нижньому куті підрахунок необхідної кількості тестувань на ВІЛ (Sum: 5,636).	