

**Національна технічна група
експертів з питань**

імунопрофілактики (НТГЕІ)

ПОЗИЦІЯ № 19-01/2024-1

**(офіційна заява, згідно з протокольним
рішенням НТГЕІ від 19.01.2024 року № 31)**

**Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з імунопрофілактики.
Дані рекомендації НТГЕІ мають рекомендований характер.**

**Рекомендації НТГЕІ щодо питання дозволу використання
омікронспецифічної вакцини виробництва Pfizer, а саме PFE-BNT 0.1mg/ml
10x2.25ml MDV WT-BA4/5 (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent
Original and Omicron BA.4/BA.5), для можливості використання її для
проведення первинного вакцинального комплексу.**

- Діти віком 12-17 років можуть бути щеплені двовалентною омікронспецифічною вакциною на мРНК платформі, що містить BA.4/5, як для первинної вакцинації, так і для бустерної дози.
- Дорослі (люди віком ≥ 18 років) можуть бути щеплені двовалентною омікронспецифічною вакциною на мРНК платформі, що містить BA.4/5, як для первинної вакцинації, так і для бустерної дози.
- Дітям віком понад ≥ 12 років та дорослим, яким розпочато первинну вакцинацію з використанням моновалентної оригінальної вакцини, можна завершити курс двовалентною омікронспецифічною вакциною на мРНК платформі, що містить BA.4/5.
- НТГЕІ вважає, що наразі відсутні додаткові занепокоєння з безпеки при використанні двовалентних омікронспецифічних вакцин на мРНК платформі для первинного курсу вакцинації у порівнянні з моновалентними оригінальними вакцинами.
- При використанні двовалентної омікронспецифічної вакцини на мРНК платформі для первинного вакцинального курсу кількість доз та інтервал між дозами такі ж, як і для оригінальних моновалентних вакцин.
- Моновалентні оригінальні вакцини на мРНК платформі можуть і надалі використовуватися для дітей віком ≥ 12 років та дорослим як для первинної вакцинації, так і для наступних бустерних щеплень.
- Використання моновалентних оригінальних вакцин на мРНК платформі для всіх чи наступних щеплень можливе за бажанням реципієнта вакцини (наприклад, вважають за краще не щепитися двовалентною омікронспецифічною вакциною на мРНК платформі в межах первинної вакцинації).
- Ці рекомендації є тимчасовими і були зроблені з урахуванням доступних даних лише для бівалентної омікронспецифічної вакцини на мРНК платформі, що містить BA.4/5.