
ordered by average-linkage clustering (1 − ρ); 132 entrants
R10 1.00 .53 .61 .50 .59 .74 .78 .44 .48 .41 .60 .59
R3 .53 1.00 .64 .66 .65 .71 .57 .53 .48 .57 .51 .43
R7 .61 .64 1.00 .90 .73 .80 .83 .64 .58 .77 .77 .72
R12 .50 .66 .90 1.00 .69 .72 .75 .64 .57 .77 .77 .66
R2 .59 .65 .73 .69 1.00 .84 .78 .48 .29 .44 .41 .25
R4 .74 .71 .80 .72 .84 1.00 .84 .51 .41 .50 .52 .41
R6 .78 .57 .83 .75 .78 .84 1.00 .52 .46 .58 .65 .60
R1 .44 .53 .64 .64 .48 .51 .52 1.00 .52 .68 .63 .59
R11 .48 .48 .58 .57 .29 .41 .46 .52 1.00 .65 .68 .69
R5 .41 .57 .77 .77 .44 .50 .58 .68 .65 1.00 .78 .77
R8 .60 .51 .77 .77 .41 .52 .65 .63 .68 .78 1.00 .88
R9 .59 .43 .72 .66 .25 .41 .60 .59 .69 .77 .88 1.00
R10 R3 R7 R12 R2 R4 R6 R1 R11 R5 R8 R9
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Spearman ρ between members' orderings