

Ejercicios del capítulo 9 de *Classical Mechanics* de H. Goldstein

Nicolás Quesada M.

Instituto de Física, Universidad de Antioquia

Ejercicio 9.9

Sea u una función de $r^2, p^2, \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$. Para mostrar que $[u, \mathbf{L}] = 0$ es suficiente ver que $[r^2, \mathbf{L}] = 0$, $[p^2, \mathbf{L}] = 0$ y $[\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \mathbf{L}] = 0$ ya que:

$$\begin{aligned} [u, \mathbf{L}] &= \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial x_i} = \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial(r^2)} \frac{\partial r^2}{\partial x_i} + \frac{\partial u}{\partial(p^2)} \frac{\partial p^2}{\partial x_i} + \frac{\partial u}{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})} \frac{\partial \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial p_i} - \left(\frac{\partial u}{\partial(r^2)} \frac{\partial r^2}{\partial p_i} + \frac{\partial u}{\partial(p^2)} \frac{\partial p^2}{\partial p_i} + \frac{\partial u}{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})} \frac{\partial \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{\partial p_i} \right) \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial x_i} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial(r^2)} \left(\frac{\partial r^2}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial p_i} - \frac{\partial r^2}{\partial p_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial x_i} \right) \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial(p^2)} \left(\frac{\partial p^2}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial p_i} - \frac{\partial p^2}{\partial p_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial x_i} \right) \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})} \left(\frac{\partial \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial p_i} - \frac{\partial \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{\partial p_i} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial x_i} \right) \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial(r^2)} [r^2, \mathbf{L}] + \frac{\partial u}{\partial(p^2)} [p^2, \mathbf{L}] + \frac{\partial u}{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \mathbf{L}] \end{aligned}$$

Ahora calculemos los corchetes de Poisson de la anterior expresión:

$$[x_l x_l, \epsilon_{ijk} x_i p_j] = \epsilon_{ijk} ([x_l x_l, x_i] p_j + x_i [x_l x_l, p_j]) = -\epsilon_{ijk} (p_j ([x_i, x_l] x_l + x_l [x_i, x_l]) + x_i ([p_j, x_l] x_l + x_l [p_i, x_l]))$$

Pero $[x_i, x_j] = [p_i, p_j] = 0$ y $[x_i, p_j] = -[p_j, x_i] = \delta_{ij}$. Así entonces:

$$[x_l x_l, \epsilon_{ijk} x_i p_j] = -\epsilon_{ijk} (2x_i x_l [p_j, x_l]) = 2\epsilon_{ijk} x_i x_j = \epsilon_{ijk} x_i x_j + \epsilon_{jik} x_j x_i = 0$$

Para el segundo término tenemos:

$$[p_l p_l, \epsilon_{ijk} x_i p_j] = \epsilon_{ijk} (p_j [p_l p_l, x_i] + x_i [p_l p_l, p_j]) = -\epsilon_{ijk} (p_j [x_i, p_l p_l]) = -\epsilon_{ijk} 2p_j p_l [x_i, p_l] = -2\epsilon_{ijk} p_j p_i = 0$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} [x_l p_l, \epsilon_{ijk} x_i p_j] &= \epsilon_{ijk} ([x_l p_l, x_i] p_j + x_i [x_l p_l, p_j]) = -\epsilon_{ijk} (p_j ([x_i, x_l] p_l + x_l [x_i, p_l]) + x_i ([p_j, x_l] p_l + x_l [p_j, p_l])) = \\ &= -\epsilon_{ijk} p_j x_i + \epsilon_{ijk} x_i p_j = 0 \end{aligned}$$

Ahora si $\mathbf{F} = u\mathbf{r} + v\mathbf{p} + w\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ donde u, v, w son funciones del mismo tipo que las del literal anterior. Entonces se pide mostrar que $[F_i, L_j] = \epsilon_{ijk} F_k$. Para ver lo anterior calculemos por separado las siguientes expresiones:

$$[u x_i, L_j] = u [x_i, L_j]$$

$$[v p_i, L_j] = v [p_i, L_j]$$

$$[w L_i, L_j] = w [L_i, L_j]$$

ya que $[u, L_j] = [v, L_j] = [w, L_j] = 0$. Ahora basta calcular las anteriores expresiones.

$$[x_l, \epsilon_{ijk} x_i p_j] = \epsilon_{ijk} (p_j [x_l, x_i] + x_i [x_l, p_j]) = \epsilon_{ilk} x_i$$

$$\begin{aligned}
[p_l, \epsilon_{ijk} x_i p_j] &= \epsilon_{ijk} (x_i [p_l, p_j] + p_j [p_l, x_i]) = -\epsilon_{ljk} p_j = \epsilon_{jlk} p_j \\
[\epsilon_{lmi} x_l p_m, \epsilon_{abj} x_a p_b] &= \epsilon_{lmi} \epsilon_{abj} (x_a [x_l p_m, p_b] + p_b [x_l p_m, x_a]) = -\epsilon_{lmi} \epsilon_{abj} (x_a ([p_b, x_l] p_m) + p_b ([x_a, p_m] x_l)) = \\
&\quad -\epsilon_{lmi} \epsilon_{abj} (-x_a p_m \delta_{bl} + \delta_{am} p_b x_l)
\end{aligned}$$

Finalmente: $[L_i, L_j] = \epsilon_{lmi} \epsilon_{abj} \delta_{bl} x_a p_m - \epsilon_{lmi} \epsilon_{abj} \delta_{am} p_b x_l = \epsilon_{lmi} \epsilon_{alj} x_a p_m - \epsilon_{lmi} \epsilon_{mbj} p_b x_l = \epsilon_{ijk} L_k$
Reuniendo todo lo anterior tenemos que (haciendo los cambios de índices adecuados en la anteriores ecuaciones):

$$[F_i, L_j] = u \epsilon_{ijk} x_k + v \epsilon_{ijk} p_k + \epsilon_{ijk} w L_k$$

Ejercicio 9.28

Para este problema tenemos que los momentos canonicos estan dados por:

$$p_k = m \dot{x}_k + \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i x_j$$

De estos se obtiene facilmente que:

$$v_k = \dot{x}_k = \frac{p_k - \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i x_j}{m}$$

Así entonces:

$$\begin{aligned}
[v_k, v_l] &= \left[\frac{p_k - \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i x_j}{m}, \frac{p_l - \frac{q}{2} \epsilon_{abl} B_a x_b}{m} \right] = \frac{1}{m^2} ([p_k, -\frac{q}{2} \epsilon_{abl} B_a x_b] - [\frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i x_j, p_l]) \\
&= \frac{1}{m^2} (-\frac{q}{2} \epsilon_{abl} B_a [p_k, x_b] - \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i [x_j, p_l]) = \frac{1}{m^2} (\frac{q}{2} \epsilon_{abl} B_a \delta_{kb} - \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i \delta_{jl}) = \frac{1}{m^2} (\frac{q}{2} \epsilon_{akl} B_a - \frac{q}{2} \epsilon_{ilk} B_i) \\
&= \frac{1}{m^2} \frac{q}{2} (\epsilon_{akl} B_a + \epsilon_{ikl} B_i) = \frac{q}{m^2} \epsilon_{akl} B_a
\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}
[x_l, v_k] &= [x_l, \frac{p_k - \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i x_j}{m}] = \frac{\delta_{lk}}{m} \\
[p_l, \dot{x}_k] &= \frac{p_k - \frac{q}{2} \epsilon_{ijk} B_i x_j}{m} = \frac{-q \epsilon_{ijk} B_i}{2m} [p_l, x_j] = \frac{q \epsilon_{ijk} B_i}{2m} \delta_{lj} = \frac{q \epsilon_{ilk} B_i}{2m}
\end{aligned}$$

$$[x_k, \dot{p}_l] = [x_k, [p_l, H]] = -[H, [x_k, p_l]] - [p_l, [H, x_k]] = -[p_l, -\dot{x}_k] = [p_l, \dot{x}_k] = \frac{q \epsilon_{ilk} B_i}{2m}$$

Para el último cálculo es necesario encontrar una expresión para \dot{p}_a , para esto usamos las ecuaciones de Hamilton:

$$H = \frac{(p_i - \frac{q}{2} B_j x_k \epsilon_{ijk}) (p_i - \frac{q}{2} B_l x_n \epsilon_{iln})}{2m}$$

Con estas se encuentran facilmente los \dot{p}_a :

$$\dot{p}_a = -\frac{\partial H}{\partial x_a} = \frac{q}{2} B_l \epsilon_{ila} \left(p_i - \frac{q}{2} B_j x_k \epsilon_{ijk} \right) + \frac{q}{2} B_j \epsilon_{ija} \left(p_i - \frac{q}{2} B_l x_n \epsilon_{iln} \right)$$

y se calcula el corchete de Poisson:

$$\begin{aligned}
[p_b, \dot{p}_a] &= \frac{1}{2m} \left(-\frac{q^2}{4} B_j B_l \epsilon_{ijk} \epsilon_{ila} [p_b, x_k] - \frac{q^2}{4} B_l B_j \epsilon_{iln} \epsilon_{ija} [p_b, x_n] \right) \\
&= \frac{q^2}{8m} B_l B_j (\epsilon_{ijb} \epsilon_{ila} + \epsilon_{ilb} \epsilon_{ija}) = \frac{q^2}{4m} (B_l B_l \delta_{ba} - B_a B_b)
\end{aligned}$$

Ejercicio 9.30

Supongamos que Q, R son constantes de movimiento entonces::

$$[Q, H] = -\frac{\partial Q}{\partial t}$$

$$[R, H] = -\frac{\partial R}{\partial t}$$

Evaluemos las siguientes cantidades:

$$\begin{aligned} [[Q, R], H] &= [R, [H, Q]] + [Q, [R, H]] = [R, \frac{\partial Q}{\partial t}] + [Q, -\frac{\partial R}{\partial t}] = \\ &= \frac{\partial R}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} \right) \frac{\partial R}{\partial p_i} - \frac{\partial Q}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{\partial R}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial R}{\partial t} \right) \frac{\partial Q}{\partial p_i} \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial [Q, R]}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial Q}{\partial x_i} \frac{\partial R}{\partial p_i} - \frac{\partial Q}{\partial p_i} \frac{\partial R}{\partial x_i} \right) = \\ &= \frac{\partial R}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial Q}{\partial p_i} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial Q}{\partial x_i} \right) \frac{\partial R}{\partial p_i} - \frac{\partial Q}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial R}{\partial p_i} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial R}{\partial x_i} \right) \frac{\partial Q}{\partial p_i} \end{aligned}$$

Para ver que $[Q, R]$ es constante de movimiento es suficiente comparar las 2 últimas expresiones y notar que las derivadas parciales conmutan.

Para mostrar que si F y H son constantes de movimiento entonces $\frac{\partial^n F}{\partial t^n}$ es constante de movimiento basta notar que $[F, H] = -\frac{\partial F}{\partial t}$ es constante de movimiento i.e:

$$\frac{d[F, H]}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\partial F}{\partial t} \right) = 0$$

Para probar que esto cierto para la n -ésima derivada se usa inducción:

Se probó para $n = 1$ se cumple i.e. : $\frac{d}{dt} \left(-\frac{\partial F}{\partial t} \right) = 0$

Ahora supongamos que se cumple para n es decir: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^n F}{\partial t^n} \right) = \left[\frac{\partial^n F}{\partial t^n}, H \right] + \frac{\partial^{n+1} F}{\partial t^{n+1}} = 0$ pero como por hipótesis $\frac{\partial^n F}{\partial t^n}$ es constante de movimiento entonces $\left[\frac{\partial^n F}{\partial t^n}, H \right]$ también lo es y por lo tanto $\frac{\partial^{n+1} F}{\partial t^{n+1}} = -\left[\frac{\partial^n F}{\partial t^n}, H \right]$ también es constante de movimiento.

Finalmente tomando $F = x - \frac{pt}{m}$ y $H = \frac{p^2}{2m}$ se verifica fácilmente que:

$$\left[x - \frac{pt}{m}, \frac{p^2}{2m} \right] = \left[x, \frac{p^2}{2m} \right] = \frac{2p}{2m} [x, p] = \frac{2p}{2m} = -\frac{\partial F}{\partial t} = -\left(-\frac{p}{m} \right) \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{p}{m}$$

Ejercicio 9.31

Sea $u = \ln(p + imq\omega) - i\omega t$ y $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$ Entonces:

$$[u, H] = \frac{\partial u}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial u}{\partial p} = \left(\frac{im\omega}{p + imq\omega} \right) \frac{p}{m} - m\omega^2 q \left(\frac{1}{p + imq\omega} \right) = i\omega \frac{p + imq\omega}{p + imq\omega} = i\omega$$

Por otro lado claramente $\frac{\partial u}{\partial t} = -i\omega$, por lo tanto u es una constante de movimiento.

Como sabemos las soluciones explícitas del problema podemos ver que es exactamente u . Si $q = A \sin(\omega t + \phi)$ entonces $p = m\omega A \cos(\omega t + \phi)$ y la cantidad dentro del logaritmo es: $m\omega A e^{i(\omega t + \phi)}$. De acuerdo a lo anterior $u = \ln m\omega A + i(\omega t + \phi) - i\omega t = i\phi + \ln \sqrt{2Em}$, donde se ha usado que $E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$. Así pues vemos que u no es más que el logaritmo de una función de la energía más i veces la fase inicial del oscilador.