

머신러닝/딥러닝을 위한

# 수치미분


- 미분 • 편미분 • 체인룰 -

# 미분 - derivative

미분을 왜 하는가? 미분으로 얻을 수 있는 인사이트?

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

f(x) 를 미분하라




[예] 함수  $f(x) = x^2$  일 경우, 미분  $f'(x) = 2x$

$f(3) = 9$  해석

=>

$f'(3) = 6$  해석

=>



# 미분 - derivative

- 머신러닝 / 딥러닝에서 자주 사용되는 함수의 미분

$$f(x) = \text{상수} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = ax^n \Rightarrow f'(x) = nax^{n-1}$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = e^{-x} \Rightarrow f'(x) = -e^{-x}$$

---

$$[\text{예 1}] \quad f(x) = 3x^2 + e^x + 7 \Rightarrow f'(x) = 6x + e^x$$

$$[\text{예 2}] \quad f(x) = \ln x + \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

참고

$$\frac{1}{x} = x^{-1}$$

# 편미분 – partial derivative

- 편미분은 입력변수가 하나 이상인 다변수 함수에서, 미분하고자 하는 변수 하나를 제외한 나머지 변수들은 상수로 취급하고, 해당 변수를 미분하는 것

예를들어  $f(x,y)$  를 변수  $x$  에 대해 편미분 하는 경우 다음과 같이 나타냄  $\rightarrow$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$$

[예1]  $f(x,y) = 2x + 3xy + y^3$  , 변수  $x$  에 대하여 편미분

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial(2x+3xy+y^3)}{\partial x} = 2 + 3y$$

[예2]  $f(x,y) = 2x + 3xy + y^3$  , 변수  $y$  에 대하여 편미분

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial(2x+3xy+y^3)}{\partial y} = 3x + 3y^2$$

[예3] 체중 함수가 ‘체중(야식, 운동)’ 처럼 야식/운동에 영향을 받는 2변수 함수라고 가정할 경우, 편미분을 이용하면 각 변수 변화에 따른 체중 변화량을 구할 수 있음

현재 먹는 야식의 양에서  
조금 변화를 줄 경우 체  
중은 얼마나 변하는가 ?



$$\frac{\partial \text{체중}}{\partial \text{야식}}$$

현재 하고 있는 운동량에 조  
금 변화를 줄 경우 체중은 얼  
마나 변하는가 ?



$$\frac{\partial \text{체중}}{\partial \text{운동}}$$

## 연쇄법칙 - chain rule

- 합성함수란 여러 함수로 구성된 함수로서, 이러한 합성함수를 미분하려면 ‘합성함수를 구성하는 각 함수의 미분의 곱’으로 나타내는 chain rule(연쇄법칙) 이용

[합성함수 예1]  $f(x) = e^{3x^2}$   함수  $e^t$ , 함수  $t = 3x^2$  조합

[합성함수 예2]  $f(x) = e^{-x}$   함수  $e^t$ , 함수  $t = -x$  조합

- $f(x) = e^{3x^2}$  을 chain rule로 미분하는 경우,  $t = 3x^2$  으로 놓으면  $f(x) = e^t$

chain rule 적용(약분 개념)

$t = 3x^2$  대입

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\cancel{\partial t}} \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial(e^t)}{\partial t} \frac{\partial(3x^2)}{\partial x} = (e^t)(6x) = (e^{3x^2})(6x) = 6xe^{3x^2}$$

- $f(x) = e^{-x}$  을 chain rule로 미분하는 경우,  $t = -x$  으로 놓으면  $f(x) = e^t$

chain rule 적용(약분 개념)

$t = -x$  대입

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\cancel{\partial t}} \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial(e^t)}{\partial t} \frac{\partial(-x)}{\partial x} = (e^t)(-1) = (e^{-x})(-1) = -e^{-x}$$