

```

> # A) is basically gwn Jordan Form en kijken wat je eigenwaarden
> eigenvectoren zijn lolz.
> restart: with(LinearAlgebra):
> A := Matrix([[ -2, 2, 2], [-5, 4, 3], [0, 0, 2]])

```

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

```

> J, Q := JordanForm(A, output = ['J','Q'])

```

$$J, Q := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - I & 0 \\ 0 & 0 & 1 + I \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{5} - \frac{2I}{5} & -\frac{1}{5} + \frac{2I}{5} \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{I}{2} & -\frac{1}{2} + \frac{I}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

```

> # Hierboven is a)
> # Ok nu b) Het idee is simpel, we willen  $\alpha_1, \alpha_2$  en  $y(t)$ 
y0 := Vector([1, 1, 1]):
> constants := solve(Q.Vector([alpha1, alpha2, conjugate(alpha2)]) = y0,
[alpha1, alpha2]);
constants := [[alpha1 = 1, alpha2 = 0]]

```

$$\text{constants} := [[\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0]] \quad (3)$$

```

> # nu nog y(t).  $y(t) = Q \cdot \exp(D) \cdot Q^{-1} \cdot y_0$ 
> D_exp := Matrix([[exp(2*t), 0, 0], [0, exp((1 - I) * t), 0], [0, 0, exp((1 + I) * t)]])

```

$$D\_exp := \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{(1-I)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{(1+I)t} \end{bmatrix} \quad (4)$$

```

> y := Q * D_exp * MatrixInverse(Q) * y0

```

$$y := \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ e^{2t} \end{bmatrix} \quad (5)$$

```

> # Et voila.
>

```