

Inhibiteurs de la PDE5 (ED & Prostate Pills)

Information pour le patient · Comprimés pour la dysfonction érectile — et les symptômes urinaires de la prostate

WARWIKI

Les inhibiteurs de la PDE5 sont des comprimés utilisés pour traiter la **dysfonction érectile (DE)**, et l'un d'eux (tadalafil) soulage aussi les symptômes urinaires liés à une **prostate élargie**. Les plus courants sont le **sildénafil (Viagra)**, le **tadalafil (Cialis)**, le **vardénafil** et l'**avanafil**. Ils aident le corps à produire une érection en réponse à une stimulation sexuelle — ils ne créent pas d'érection par eux-mêmes.

Comment ça fonctionne

Ces médicaments **détendent les vaisseaux sanguins** du pénis pour permettre l'afflux de sang. Il est essentiel de noter qu'ils agissent **uniquement avec une stimulation sexuelle** — vous devez ressentir du désir ; le comprimé ne provoque pas d'érection automatique. Le tadalafil détend aussi les muscles de la prostate et de la vessie, ce qui explique pourquoi une faible dose quotidienne peut améliorer le débit urinaire.

À quoi s'attendre

- Le **sildénafil / vardénafil / avanafil** agissent en environ **30–60 minutes** et durent quelques heures.
- Le **tadalafil** a une action prolongée (jusqu'à ~36 heures — l'option "week-end") ou peut être pris en **faible dose quotidienne**.
- Un repas copieux et gras peut **retarder** l'effet du sildénafil ; le tadalafil n'est pas affecté par les aliments.
- Il peut falloir plusieurs essais pour trouver la bonne dose et le bon moment.

COMPRENDRE LES TERMES

Inhibiteur de la PDE5

La classe de comprimés (sildénafil, tadalafil, etc.) utilisés pour la DE.

Dysfonction érectile (DE)

Difficulté à obtenir ou maintenir une érection suffisamment ferme pour les rapports sexuels.

Dérivés nitrés

Médicaments pour les douleurs cardiaques/thoraciques qui ne doivent JAMAIS être combinés avec ces comprimés.

À la demande ou quotidien

Pris avant un rapport sexuel, ou en faible dose chaque jour.

HBP

Hypertrophie bénigne de la prostate ; le tadalafil traite aussi ses symptômes urinaires.

Priapisme

Une érection durant plus de 4 heures — une urgence médicale.

LA RÈGLE LA PLUS IMPORTANTE Ne prenez jamais ces comprimés avec des **dérivés nitrés** (comme la nitroglycérine ou l'isosorbide pour les douleurs thoraciques) ni avec des "poppers" (nitrite d'amyle). La combinaison peut provoquer une **chute de pression artérielle dangereuse, voire mortelle**. Signalez à chaque professionnel de santé que vous prenez un inhibiteur de la PDE5.

Comment le prendre

- Prenez-le **selon la prescription** — avant un rapport (à la demande) ou quotidiennement, selon votre ordonnance.
- Pour le sildénafil à la demande, prenez-le **l'estomac relativement vide** pour un effet plus rapide.
- Ne prenez pas plus d'une dose en 24 heures sauf indication contraire.

Sécurité — points essentiels

- **Pas de dérivés nitrés ni de poppers** — jamais (voir ci-dessus).
- Soyez prudent avec les **alpha-bloquants** et autres médicaments pour la pression artérielle (risque d'étourdissements) — votre équipe soignante les espacera ou les ajustera.
- En cas de **maladie cardiaque significative**, confirmez avec votre médecin que les rapports sexuels et ces comprimés sont sans danger pour vous.
- Limitez l'**alcool**, qui amplifie les étourdissements.

Effets secondaires courants

- Maux de tête, **rougeur** du visage, nez bouché, indigestion
- Douleurs dorsales ou musculaires (surtout avec le tadalafil)
- **Légère teinte bleutée** de la vision (sildénafil/vardénafil)

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une érection durant **plus de 4 heures** (priapisme)
- **Perte soudaine de la vision ou de l'ouïe** — arrêtez le comprimé et consultez
- **Douleur thoracique**, évanouissement ou étourdissements sévères

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Les inhibiteurs de la PDE5 vous aident à obtenir une érection **avec stimulation** (ils ne fonctionnent pas seuls) ; le tadalafil soulage aussi les symptômes urinaires de la prostate.
2. **Ne combinez jamais avec des dérivés nitrés ou des poppers** — la chute de pression artérielle peut être mortelle.
3. Consultez en urgence pour une érection de plus de 4 heures, ou une perte soudaine de vision ou d'ouïe.