

Thérapie par traction pénienne

Information pour le patient · Un dispositif portable qui étire doucement pour réduire la courbure

WARWIKI

La thérapie par traction pénienne utilise un dispositif qui applique un **étirement doux et soutenu** sur le pénis au fil du temps. Elle est utilisée principalement pour la **maladie de La Peyronie** (pour réduire la courbure et aider à préserver la longueur), ainsi que pour la réhabilitation pénienne — par exemple, pour maintenir la longueur après une chirurgie de prothèse. C'est un traitement non chirurgical et sans danger, mais il ne fonctionne qu'avec une **utilisation quotidienne régulière pendant plusieurs mois**.

Comment ça fonctionne

Une tension douce et soutenue encourage le tissu et la cicatrice (plaque) à se **remodeler** progressivement, ce qui peut réduire la courbure et aider à préserver la longueur. L'effet est modeste et graduel — il s'agit d'un traitement lent et régulier, pas d'une solution rapide. Il est souvent combiné à d'autres traitements de la maladie de La Peyronie.

À quoi s'attendre

- Vous portez le dispositif pendant une **durée définie chaque jour**, en suivant les instructions spécifiques à votre modèle (certains se portent plus longtemps ; les plus récents s'utilisent en courtes séances plusieurs fois par jour).
- Les résultats s'accumulent sur **plusieurs mois** — la régularité est essentielle.
- Les meilleurs résultats surviennent généralement en **phase active** de la maladie de La Peyronie ou en association avec d'autres traitements.

COMPRENDRE LES TERMES

Thérapie par traction

Utilisation d'un dispositif pour étirer doucement le pénis au fil du temps.

Maladie de La Peyronie

Tissu cicatriciel qui courbe le pénis — principale indication de la traction.

Plaque

Le tissu cicatriciel que l'étirement aide à remodeler.

Réhabilitation pénienne

Maintien de la longueur et de la fonction, par exemple après une chirurgie de prothèse.

Phase active vs stable

Selon que la courbure de la maladie de La Peyronie évolue encore ou est stabilisée.

EST-CE QUE ÇA MARCHE VRAIMENT ? Cela peut apporter une **amélioration modeste et réelle** de la courbure et de la longueur — mais seulement si vous l'utilisez fidèlement pendant des mois. Considérez-le comme de la kinésithérapie pour le pénis : graduel et tributaire de la régularité. Seul, il ne redressera pas complètement une courbure sévère, et il se combine bien avec les injections ou la chirurgie.

Utilisation en toute sécurité

- 1 Suivez exactement les instructions de votre dispositif concernant la **durée de port et la tension** — ne serrez pas trop.
- 2 Utilisez-le sur un pénis flaccide ; arrêtez la séance si vous ressentez un **engourdissement, un changement de couleur ou une douleur**.
- 3 Augmentez progressivement la durée de port au fur et à mesure que vous vous y habituez.
- 4 Gardez le dispositif propre et prenez des pauses selon les instructions.

Bon à savoir

- Discret, il s'utilise à domicile ; beaucoup d'hommes le combinent avec d'autres traitements de la maladie de La Peyronie.
- La patience est indispensable — évaluez les résultats sur des mois, pas sur des jours.
- Demandez à votre équipe soignante quel dispositif et quel programme elle recommande.

Arrêtez et appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Engourdissement** ou pénis froid, pâle ou bleuté qui ne récupère pas rapidement
- Douleur persistante, lésion cutanée ou plaies
- Aggravation de la courbure ou apparition de nouvelles bosses

Effets courants

- Rougeur temporaire ou marques à l'endroit où le dispositif est posé
- Légère gêne qui s'atténue avec l'adaptation

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La traction pénienne étire doucement le pénis pour réduire la courbure de la maladie de La Peyronie et aider à préserver la longueur — traitement non chirurgical et sans danger.
2. Elle ne fonctionne qu'avec une **utilisation quotidienne régulière pendant plusieurs mois** ; les résultats sont progressifs et modestes, souvent combinés à d'autres traitements.
3. Ne serrez jamais trop. Arrêtez et appelez votre équipe soignante en cas d'engourdissement, de changement de couleur ou de douleur persistante.