

Neurostimulation tibiale percutanée (PTNS)

Information pour le patient · Stimulation douce du nerf tibial à la cheville pour la vessie hyperactive

WARWIKI

La PTNS est un traitement sans médicament, réalisé en consultation, pour la **vessie hyperactive** — besoin urgent d'uriner, mictions fréquentes et fuites par urgenturie. Une fine aiguille placée près de la cheville délivre de légères impulsions électriques au **nerf tibial**, qui partage un trajet nerveux avec les nerfs contrôlant la vessie. Au fil des séances, cela apaise les signaux vésicaux.

Comment ça fonctionne

Le nerf tibial, situé près de la malléole interne, se connecte aux mêmes nerfs spinaux qui commandent la vessie. Sa stimulation douce envoie des signaux qui **recalibrent et apaisent** l'hyperactivité vésicale — réduisant l'urgenturie et la fréquence des mictions. Aucun médicament, aucun effet indésirable systémique.

Est-ce fait pour moi ?

- Bonne option quand les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas et que vous souhaitez **éviter les médicaments** (ou s'ils ont causé des effets indésirables)
- Sans médicament — utile si vous ne pouvez pas prendre de traitements vésicaux
- Demande un **engagement dans la répétition des séances** pour être efficace et le rester

COMPRENDRE LES TERMES

Vessie hyperactive

Besoin urgent et mictions fréquentes causés par une contraction prématurée de la vessie.

Nerf tibial

Nerf situé près de la cheville, relié à l'innervation de la vessie.

Neuromodulation

Utilisation de signaux électriques doux pour calmer des nerfs hyperactifs.

Percutané

À travers la peau — via une fine aiguille électrode.

Séances d'entretien

Séances de suivi espacées pour maintenir le bénéfice.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La plupart des personnes ressentent seulement un léger picotement, une pulsation ou une légère contraction des orteils — pas de douleur. Chaque séance dure environ **30 minutes** en position assise et confortable ; vous pouvez rentrer chez vous en voiture et reprendre vos activités normales immédiatement.

Déroulement

- 1 Vous êtes assis(e) avec la jambe soutenue ; une **fine aiguille électrode** est placée près de la malléole interne.
- 2 Un petit appareil délivre de **légères impulsions** pendant environ 30 minutes.
- 3 L'aiguille est retirée — rien ne reste en place entre les séances.

Le calendrier de traitement

- En général, **une séance par semaine pendant 12 semaines** en phase initiale.
- La plupart des personnes qui répondent au traitement poursuivent ensuite des **séances d'entretien occasionnelles** pour maintenir le bénéfice.
- Un dispositif de neurostimulation tibiale **implantable** est également disponible dans certains centres pour une stimulation à domicile au long cours.

À savoir

- Effectuez les **12 semaines complètes** — le bénéfice se construit progressivement.
- Pas de médicaments, pas de chirurgie, pas de convalescence.
- Des séances régulières sont nécessaires ; le bénéfice peut s'estomper si vous arrêtez.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Rougeur, gonflement ou écoulement au site d'insertion à la cheville
- De la fièvre ou une douleur importante à la cheville après une séance
- Une aggravation soudaine de vos symptômes urinaires

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La PTNS apaise la vessie hyperactive par une stimulation douce du nerf tibial à la cheville — sans médicament, sans effets indésirables systémiques.
2. Le traitement comprend généralement une séance hebdomadaire pendant 12 semaines, puis des séances d'entretien ; chaque séance dure environ 30 minutes et est indolore.
3. Effectuez le traitement complet et prévoyez un entretien régulier pour conserver le bénéfice.