

# Urétrostomie périnéale

WARWIKI

Information pour le patient · Un orifice permanent pour uriner dans le périnée

L'urétrostomie périnéale crée un orifice permanent pour uriner dans le périnée — la zone située entre le scrotum et l'anus. Elle est utilisée lorsque l'urètre est trop rétréci, cicatrisé ou endommagé pour être réparé. Après l'opération, vous urinez assis par cet orifice plutôt que par l'extrémité du pénis. Ce document explique le fonctionnement, la préparation et ce à quoi s'attendre.

## À propos de cette intervention

Un **rétrécissement de l'urètre** est un segment cicatrisé et rétréci qui bloque le flux urinaire. Lorsque le rétrécissement est long, récidive après réparation ou que l'urètre est trop endommagé pour être reconstruit, le chirurgien amène la **partie saine de l'urètre** (en amont du rétrécissement) à la peau du périnée et la suture en orifice permanent. L'urine quitte alors le corps par cet orifice.

C'est une solution **fiable et durable** qui évite des reconstructions longues ou répétées — un bon choix pour les rétrécissements complexes ou si vous préférez ne pas avoir plusieurs opérations.

## Ce qu'il faut savoir

Le principal changement est que vous **urinerez assis** par le nouvel orifice ; l'urine ne sort plus par l'extrémité du pénis. La plupart des hommes s'y adaptent bien et sont satisfaits. Votre **pénis reste en place** — la sensibilité et l'orgasme sont généralement inchangés, et la plupart des hommes conservent leurs érections (une modification est possible). Avec le temps, l'orifice peut se **rétrécir** ; une petite procédure suffit habituellement à le rouvrir.

## COMPRENDRE LES TERMES

### Urètre

Le tube qui conduit l'urine hors du corps.

### Rétrécissement de l'urètre

Segment cicatrisé et rétréci qui bloque le flux urinaire.

### Périnée

Zone entre le scrotum et l'anus, où le nouvel orifice est créé.

### Urétrostomie périnéale

Opération qui amène l'urètre vers un orifice permanent dans le périnée.

### Stomie

Le nouvel orifice par lequel l'urine quitte le corps.

### Rétrécissement de la stomie

Resserrement progressif du nouvel orifice — généralement corrigé par une petite procédure.

### Sonde

Tube souple laissé en place une à deux semaines le temps de la cicatrisation.

### Anesthésie générale

Médicament qui vous maintient endormi et sans douleur pendant l'opération.

**EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ?** L'opération se déroule sous anesthésie générale ou rachianesthésie : vous ne sentez rien. Ensuite, le périnée est gonflé, marqué d'ecchymoses et douloureux pendant 1 à 2 semaines — bains de siège chauds, glace et antidouleurs aident. Une sonde est posée. Beaucoup rentrent le jour même ou après une nuit.

## Comment vous préparer (avant la chirurgie)

- Intervention sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — respectez toutes les consignes préopératoires (jeûne, médicaments à suspendre, dont les anticoagulants).
- Un **examen d'urine** recherche une infection (traitée au préalable) ; des antibiotiques vous seront administrés. **Ne fumez pas** — cela ralentit la cicatrisation.
- Vos jambes seront placées dans des étriers pendant l'opération. Prévoyez une **sonde pendant environ 1 à 2 semaines** et un accompagnateur pour le retour.

### Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez eu une **radiothérapie pelvienne** — le risque de rétrécissement de l'orifice est plus élevé
- Prenez un anticoagulant ou avez une infection en cours

## Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé sous anesthésie, jambes en étriers ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Par une incision dans le périnée, le chirurgien repère la partie saine de l'urètre en amont du rétrécissement et enlève ou contourne la zone cicatrisée.
- 3 La partie saine de l'urètre est amenée jusqu'à la peau et suturée en un large orifice permanent ; une sonde est mise en place et la plaie est refermée.

## Après la chirurgie

- Les bains de siège chauds, la glace et les antidouleurs soulagent le gonflement et la douleur ; gardez la zone propre.
- La **sonde reste environ 1 à 2 semaines**, puis votre équipe la retire. Vous urinerez ensuite **assis** par le nouvel orifice.
- **Évitez le port de charges lourdes, les efforts, le vélo et les rapports sexuels** pendant plusieurs semaines ; ne vous asseyez pas directement sur la zone.
- Si votre jet **s'affaiblit**, l'orifice se rétrécit peut-être — signalez-le ; une petite procédure peut le rouvrir.

### Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- La sonde qui tombe ou cesse de drainer, ou l'**impossibilité d'uriner** après son retrait
- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur, gonflement ou écoulement croissant au niveau de la plaie
- Un saignement abondant

## TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'urétrostomie périnéale crée un orifice permanent pour uriner dans le périnée — utilisée quand l'urètre est trop rétréci ou endommagé pour être réparé. Vous urinez ensuite **assis**.
2. C'est une solution durable et fiable qui évite une chirurgie longue ou répétée. Votre **pénis reste en place** ; sensibilité, orgasme et érections sont généralement inchangés.
3. Prévoyez une sonde pendant ~1 à 2 semaines. L'orifice peut se rétrécir — signalez tout affaiblissement du jet.