

الإستروجين المهبلي هو إستروجين منخفض الجرعة يُوضع مباشرةً في المهبل — على شكل كريم أو قرص أو حلقة — لعلاج الجفاف والتهيج وألم الجماع وأعراض المسالك البولية الناجمة عن انخفاض الإستروجين بعد انقطاع الطمث. ولأنه يعمل موضعياً، تصل كميات ضئيلة جداً إلى مجرى الدم، مما يجعله آمناً لمعظم المرضى.

ما الذي يعالجه

بعد انقطاع الطمث، يؤدي انخفاض الإستروجين إلى ترقق وجفاف أنسجة المهبل والإحليل — وهي حالة تُعرف بمتلازمة الجهاز البولي التناسلي لانقطاع الطمث (GSM). يُعيد الإستروجين المهبلي بناء هذا الغشاء المبطن ويُساعد على:

- تخفيف الجفاف والحرقنة والحكة وألم الجماع
- تقليل إلحاح التبول وكثرته
- خفض خطر عدوى المسالك البولية (UTI) المتكررة

هل هو آمن؟

لمعظم المرضى، نعم. الإستروجين المهبلي منخفض الجرعة وموضعي — يختلف كثيراً عن حبوب الإستروجين أو اللصقات المستخدمة لهبات الحرارة — مع امتصاص ضئيل في الجسم. حتى مَنْ لديهم تاريخ مع سرطان الثدي أو سرطانات حساسة للهرمونات يمكنهن في كثير من الأحيان استخدامه؛ ناقشي ذلك مع فريقك الطبي كقرار مشترك.

تعلم المصطلحات

GSM

متلازمة الجهاز البولي التناسلي لانقطاع الطمث — جفاف وترقق وأعراض بولية ناجمة عن انخفاض الإستروجين.

الإستروجين المهبلي

إستروجين منخفض الجرعة يُوضع في المهبل (كريم أو قرص أو حلقة).

موضعي مقابل جهاز

الموضعي يعمل في مكان تطبيقه؛ الجهاز (حبوب/لصقات) يؤثر في الجسم كله.

جرعة الصيانة

الجرعة المنخفضة المستمرة بعد الأسابيع الأولى.

UTI المتكررة

عدوى المئانة المتكررة التي يُساعد الإستروجين المهبلي على الوقاية منها.

مرطب / مرطب

منتجات غير هرمونية يمكن استخدامها إلى جانب العلاج.

متى يبدأ المفعول؟ تشعر كثيرات بتحسّن خلال أسابيع قليلة، ويكتمل المفعول بحلول نحو 8-12 أسبوعاً. يعمل العلاج فقط أثناء الاستمرار فيه، لذا فهو علاج مستمر — تعود الأعراض عادةً عند التوقف.

كيف تستخدمينه

معلومات مفيدة

- يمكنك إضافة مرطب أو مزلق غير هرموني لمزيد من الراحة.
- إفرازات خفيفة أو نزيف بسيط عند البداية أمر شائع وعادةً ما يزول.
- يتكامل العلاج مع تمارين قاع الحوض وعلاجات المثانة الأخرى.

اتصلي بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- أي نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث — يجب دائماً فحصه
- كتلة جديدة في الثدي أو أعراض غير معتادة
- تهيج يزداد سوءاً بدلاً من التحسّن

الأشكال المتاحة

- الكريم — جرعة مرنة بمحقن
- القرص / التحميلة — مرتّب وجرعته محددة مسبقاً
- الحلقة — تُوضع كل 3 أشهر، سهلة الاستخدام

ثلاثة أمور تنكّريها

1. الإستروجين المهبلي علاج موضعي منخفض الجرعة للجفاف وألم الجماع والأعراض البولية المرتبطة بانقطاع الطمث — مع امتصاص جهازه ضئيل جداً.
2. استخدامه يومياً لمدة أسبوعين تقريباً، ثم مرتين أسبوعياً بصفة مستمرة (أو حلقة كل 3 أشهر)؛ الفائدة تعتمد على الاستمرار.
3. آمن لمعظم المرضى — ناقشي أي تاريخ مرضي مع سرطان مع فريقك الطبي. أبلغني دائماً عن أي نزيف بعد انقطاع الطمث.