

تُعالج جراحة تعليق المهبل هبوط قمة المهبل أو الرحم بإعادة تثبيتها في أربطة الحوض القوية — باستخدام أنسجتك الخاصة دون أي شبكة اصطناعية. تُجرى كاملةً عبر المهبل دون شق في البطن، وهي طريقة متينة وخالية من الشبكة لاستعادة الدعامة وعمق المهبل.

عن هذا الإجراء

تُخاط قمة المهبل برابط قوي في الحوض لتثبيتها في مكانها. النوعان الشائعان هما:

- **تعليق الرباط الرحمي العجزي (USLS)** — التثبيت في الأربطة الرحمية العجزية العميقة في الحوض
 - **تثبيت الرباط الشوكي العجاني (SSLF)** — التثبيت في الرباط الشوكي العجاني باتجاه الجانب
- كلاهما يستخدم **أنسجتك الخاصة** (غرز دائمة)، ويتجنب الشبكة الاصطناعية. غالبًا ما يُدمجان مع إصلاح الجدار الأمامي أو الخلفي، ويُجريان عند استئصال الرحم في نفس الوقت.

مقارنة مع البدائل

مقارنةً برأب عنق المثانة بالشبكة العجزية (الذي يرفع المهبل بشبكة بطنية)، يتجنب تعليق المهبل الشبكة والشق البطني؛ وقد يكون الرأب العجزي أكثر متانة. سيساعدك جراحك في تقييم خيارات العلاج المناسبة لك.

تعلم المصطلحات

القمة / القبو

قمة المهبل، التي قد تهبط مع الهبوط.

التعليق

إعادة تثبيت قمة المهبل في رباط قوي.

USLS

تعليق الرباط الرحمي العجزي.

SSLF

تثبيت الرباط الشوكي العجاني.

النسيج الذاتي

أنسجتك الخاصة — هذا الإصلاح لا يستخدم شبكة.

هبوط القبو

هبوط قمة المهبل، غالبًا بعد استئصال الرحم.

هل سيؤلم؟ تُجرى العملية تحت التخدير فلا تشعرين بشيء أثناءها، ولا يوجد شق في البطن. مع النوع الشوكي العجاني (SSLF)، قد يلاحظ بعض المرضى انزعاجًا في منطقة الأرداف أو الفخذ العلوي لأيام أو أسابيع قليلة أثناء التعافي — وهذا يزول عادةً من تلقاء نفسه.

كيف تستعدّ

بعد الجراحة

- العودة للمنزل في نفس اليوم أو بعد ليلة واحدة؛ بعض الإفرازات أو النزيف الخفيف طبيعي.
- تجنّبي الرفع الثقيل والإجهاد والجماع لمدة 6 أسابيع تقريبًا.
- انزعاج الأرداف (مع SSLF) يتلاشى عادةً خلال أسابيع؛ حافظي على ليونة البراز.

- اتبعي تعليمات التخدير (الصيام، وإيقاف مميعات الدم كما أُخبرت).
- تقييم ما قبل العملية؛ يمكن دمج إصلاحات أخرى أو إجراء لمنع التسرب في نفس الوقت.
- أقلعي عن التدخين، ورتّبي وسيلة توصيل ومساعدة في المنزل.

ما الذي يحدث

- 1 تكوينين تحت التخدير وتُعطى المضادات الحيوية.
- 2 عبر المهبل، تُخاط قمته برباط حوضي قوي.
- 3 تُجرى إصلاحات الجدار الإضافية كما هو مخطط.
- 4 تُوضع قسطرة وأحيانًا حشوة مهبلية لفترة قصيرة.

اتصلي بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة، أو نزيف غزير
- عدم القدرة على التبول، أو تفاقم ألم الحوض
- ألم شديد أو حاد في الأرداف أو الساق، أو تنميل جديد

ثلاثة أمور تدّكرها

1. تعليق المهبل يرفع قمته بأربطتك الخاصة — متين وخالٍ من الشبكة ويُجرى عبر المهبل.
2. النوعان الشائعان هما USLS وSSLF؛ الرأب العجزي هو البديل بالشبكة/الجراحة البطنية للمقارنة.
3. تجنّبي الرفع الثقيل والجماع ~6 أسابيع. قد يحدث ألم خفيف في الأرداف مع SSLF؛ اتصلي عند الحمّى أو النزيف الغزير أو الألم الشديد في الساق أو الأرداف.