

تصوير المثانة والإحليل أثناء التبول — أو "VCUG" — فحص بالأشعة السينية يلتقط صوراً للمثانة والإحليل (مجرى البول) أثناء ملء المثانة بصبغة خاصة وأثناء التبول. يُظهر كيف تمتلئ المثانة وتفرغ، ويساعد فريقك الطبي على اكتشاف مشكلات كالارتداد البولي نحو الكليتين، أو التضيق، أو التسرب.

عن هذا الفحص

تخزن المثانة البول، والإحليل هو الأنبوب الذي يحمله إلى خارج الجسم. يملأ فحص VCUG المثانة بصبغة تظهر ببيضاء على الأشعة، ثم يسجل الصور أثناء التبول. وبما أنه يرصد المثانة والإحليل في أثناء العمل، فهو يكشف ما لا تستطيع الصورة الثابتة إظهاره.

قد يطلب فريقك الطبي إجراء VCUG من أجل:

- رؤية كيفية امتلاء المثانة وتفرغها
- التحقق من ارتداد البول نحو الكليتين (الجزر)
- فحص عنق المثانة والإحليل أثناء التبول
- اكتشاف تضيق أو تسرب أو جيبية صغيرة (رتج)
- متابعة التعافي بعد جراحة المثانة أو البروستاتا أو الإحليل

يفحص هذا الاختبار الجهاز البولي السفلي — المثانة والإحليل. وهو صورة تُرشد علاجك، وليس علاجاً بحد ذاته.

هل هو آمن؟

نعم. VCUG فحص شائع ومنخفض المخاطر. جرعة الأشعة المستخدمة صغيرة، والصبغة تغادر الجسم مع البول. أكثر المشكلات شيوعاً هي عدوى بسيطة في المسالك البولية (UTI) ناجمة عن القسطرة — لهذا تُستخدم تقنية معقمة وقد يُعطى مضاد حيوي أحياناً. الشعور الخفيف بعدم الارتياح أو الحرقة أو وجود أثر دم عند التبول بعد الفحص أمور طفيفة وتزول سريعاً.

تعلم المصطلحات

المثانة

العضو الذي يخزن البول حتى تكون مستعداً لتفريغه.

الإحليل (مجرى البول)

الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم.

القسطرة

أنبوب رفيع ومرن يُصرف منه البول أو يملأ المثانة. يمكن إدخال الصبغة عبر قسطرة موجودة لديك، أو عبر قسطرة توضع خلال الإحليل لأغراض الفحص.

قسطرة فوق العانة (SPT)

قسطرة تُصرف المثانة عبر فتحة صغيرة في أسفل البطن بدلاً من الإحليل. إذا كانت لديك، يمكن استخدامها لملء المثانة أثناء الفحص.

صبغة التباين

سائل يظهر أبيض على الأشعة السينية حتى تتضح صورة المثانة والإحليل.

التبول

إفراغ المثانة. أهم الصور تُلتقط أثناء التبول.

الجزر (الارتداد)

ارتداد البول من المثانة نحو الكليتين. يمكن لـ VCUG إظهار ذلك.

التصوير الفلوري

نوع من الأشعة السينية يُظهر صوراً متحركة مباشرة أثناء تدفق الصبغة.

صورة ما بعد التبول

صورة تُلتقط بعد التبول لمعرفة مدى اكتمال تفريغ المثانة.

هل سيؤلم؟ إذا كانت لديك قسطرة أو قسطرة فوق العانة، تدخل الصبغة عبرها — لا يوضع أي شيء جديد. وإلا، تُوضع قسطرة رقيقة أولاً (ضغط خفيف أو وخز قصير). الطلب منك التبول أثناء الفحص أمر طبيعي. يستغرق الفحص نحو 30 دقيقة.

كيف تستعدّ (قبل الفحص)

التحضير بسيط للغاية. في معظم الحالات:

- إذا كانت لديك قسطرة بولية أو قسطرة فوق العانة، أبقيها في مكانها — ستستخدم عادةً لملء المثانة، فلا حاجة لأنبوب جديد.
- يمكنك الأكل والشرب بشكل طبيعي وتناول أدويةك المعتادة، ما لم يُخبرك فريقك بخلاف ذلك.
- يمكنك عادةً قيادة سيارتك للمنزل، إذ لا يُستخدم مهدئ في معظم الحالات لدى البالغين.

أخبر فريقك مسبقاً إذا:

- سبق أن أصبت بتفاعل تجاه صبغة الأشعة أو اليود
 - كنت تتناول مضاداً للتخثر (مميعاً للدم)
 - احتملت أنك حامل — تُتجنب الأشعة عادةً أثناء الحمل
 - لديك علامات على عدوى بولية (حرقة، حمى، أو بول عكر ذو رائحة نفاذة) — قد يؤدي ذلك إلى تأجيل الفحص
- قد يُطلب منك تقديم عينة بول للتحقق من وجود عدوى، وقد يُعطى لك مضاد حيوي للتقليل من خطر الإصابة بها.

ما الذي يحدث أثناء الفحص

- 1 تستلقي على طاولة الأشعة.
- 2 تدخل الصبغة إلى المثانة. إذا كانت لديك قسطرة فوق العانة أو قسطرة إحليلية، تدخل عبرها — لا يوضع شيء جديد. وإلا، تُمرّر قسطرة رقيقة عبر الإحليل.
- 3 تُملأ المثانة ببطء بالصبغة عبر الأنبوب. ستشعر بامتلاء متزايد كالحاجة إلى التبول. تُلتقط الصور أثناء الملء.
- 4 عند امتلاء المثانة، يُطلب منك التبول بينما تسجّل الأشعة — وهو أهم جزء من الفحص. تُزال القسطرة عادةً قبل ذلك؛ وقد تُغلق قسطرة فوق العانة مؤقتاً.
- 5 قد تُلتقط صورة أخيرة بعد الانتهاء من التبول للتحقق من مدى اكتمال تفريغ المثانة.

بعد الفحص

- يمكنك عادةً العودة إلى المنزل واستئناف أنشطتك الطبيعية فوراً.
- قد تشعر بحرقة خفيفة عند التبول، أو بآثر دم أو لون وردي لمدة يوم تقريباً — شرب كميات إضافية من الماء يُساعد.
- إذا كان لديك قسطرة أو قسطرة فوق العانة، سيُرشدك فريقك إلى طريقة العناية بها. تختفي الصبغة تدريجياً مع البول خلال ساعات قليلة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- صعوبة في التبول أو عدم القدرة على التبول إطلاقاً
- نزيف غزير أو نزيف لا يتوقف
- ألم يزداد سوءاً بدلاً من أن يتحسن

ثلاثة أمور تذكّرها

- 1 فحص VCUG أشعة آمنة تملأ المثانة بصبغة وتسجّل التبول — يُظهر كيف تعمل المثانة والإحليل ويكتشف مشكلات كالجُرّ نحو الكليتين.
- 2 التحضير بسيط: كُل واشرب وتناول أدويةك المعتادة — لكن أخبر فريقك عن أي حساسية للصبغة، أو مميّعات الدم، أو احتمال الحمل، أو علامات عدوى بولية.
- 3 تدخل الصبغة عبر قسطرة موجودة لديك أو عبر أنبوب رفيع يُوضع للفحص؛ ثم تتبول أثناء التصوير. حرقة خفيفة أو أثر دم ليوم واحد أمر طبيعي — اشرب ماءً إضافياً، واتصل بالفريق في حال الحمى أو النزيف الغزير أو صعوبة التبول.