

PDE5 Inhibitors (ED & Prostate Pills)

Impormasyon para sa Pasyente · Mga tableta para sa erectile dysfunction — at sa mga sintomas ng prostate

WARWIKI

Ang PDE5 inhibitors ay mga tableta para sa **erectile dysfunction (ED)**, at ang isa sa kanila (tadalafil) ay nagpapabuti rin ng mga sintomas sa pag-ihi na dulot ng **malaking prostate**. Ang mga karaniwang gamit ay **sildenafil (Viagra)**, **tadalafil (Cialis)**, **vardenafil**, at **avanafil**. Tinutulungan nila ang katawan na makapagtigas ng ari kapag may sekswal na pagnanasa — hindi sila nagdudulot ng tigas nang kusa.

Paano Ito Gumagana

Ang mga gamot na ito ay **nagpapaluwag ng mga ugat** sa ari para makapasok ang dugo. Mahalaga: gumagana lamang ito **kapag may sekswal na pagnanasa** — kailangan pa rin na maramdaman ang pagnanais; hindi awtomatikong nagtitigas. Nagpapaluwag din ang tadalafil ng mga kalamnan sa prostate at pantog, kaya ang mababang pang-araw-araw na dosis nito ay nagpapabuti ng daloy ng ihi.

Ano ang Aasahan

- **Sildenafil / vardenafil / avanafil** ay gumagana sa loob ng **30–60 minuto** at nagtatagal ng ilang oras.
- **Tadalafil** ay mas matagal (hanggang ~36 na oras — ang opsyong “para sa weekend”) o maaaring inumin bilang **mababang dosis araw-araw**.
- Ang mabigat at mataba na pagkain ay maaaring **magpalambat** ng epekto ng sildenafil; ang tadalafil ay hindi apektado ng pagkain.
- Maaaring kailanganin ng ilang pagsubok para mahanap ang tamang dosis at timing.

MGA TERMINO

PDE5 inhibitor

Ang klase ng tableta (sildenafil, tadalafil, atb.) para sa ED.

Erectile dysfunction (ED)

Hirap na magtigas ng ari o mapanatili ang tigas para sa sekswal na gawain.

Nitrates (gamot sa puso)

Mga gamot para sa sakit sa dibdib na HINDI DAPAT isama sa mga tableta na ito.

As-needed vs. daily

Iniinom bago ang seks, o mababang dosis tuwing araw.

BPH

Paglaki ng prostate (BPH); tinutulungan din ng tadalafil ang mga sintomas sa pag-ihi nito.

Priapism

Tigas ng ari na higit sa 4 na oras — emergency ito.

ANG PINAKAMAHALAGANG PANUNTUNAN Huwag kailanman inumin ang mga tableta na ito kasabay ng **nitrates (gamot sa puso)** (tulad ng nitroglycerin o isosorbide para sa sakit sa dibdib) o ng “poppers” (amyl nitrite). Ang pinagsama ay maaaring magdulot ng **mapanganib at nakamamatay na pagbagsak ng blood pressure**. Sabihin sa bawat doktor na ikaw ay umiinom ng PDE5 inhibitor.

Paano Inumin

- Inumin **ayon sa utos ng doktor** — bago ang seks (as-needed) o araw-araw, depende sa reseta.
- Para sa as-needed sildenafil, inumin nang **medyo walang laman ang tiyan** para sa mabilis na epekto.
- Huwag uminom ng higit sa isang dosis sa loob ng 24 na oras maliban kung sinabihan.

Mahahalagang Paalala sa Kaligtasan

- Walang nitrates o poppers** — kailanman (tingnan sa itaas).
- Mag-ingat sa **alpha blockers** at iba pang gamot sa blood pressure (maaaring magdulot ng pagkahilo) — itatakda ng inyong care team ang pagitan o iaayon ang dosis.
- Kung mayroon kang **malubhang sakit sa puso**, kumumpirma muna sa doktor na ligtas ang seks at ang mga gamot na ito para sa iyo.
- Limitahan ang **alak**, na nagdaragdag ng pagkahilo.

Mga Side Effect

- Sakit ng ulo, pamumula ng mukha (flushing), baradong ilong, heartburn
- Sakit sa likod o kalamnan (mas karaniwan sa tadalafil)
- Pansamantalang **bahagyang asul na kulay** sa paningin (sildenafil/vardenafil)

Humingi ng emergency na tulong kung mayroon kayo:

- Tigas ng ari na **higit sa 4 na oras** (priapism)
- Biglaang pagkawala ng paningin o pandinig** — itigil ang gamot at humingi ng tulong
- Sakit sa dibdib**, pagkahimatay, o matinding pagkahilo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Tinutulungan kayo ng PDE5 inhibitors na magtigas ng ari **kapag may pagnanasa** (hindi gumagana nang kusa); tinutulungan din ng tadalafil ang mga sintomas sa pag-ihi ng prostate.
- Huwag kailanman isama sa **nitrates o poppers** — ang pagbagsak ng blood pressure ay maaaring nakamamatay.
- Humingi ng emergency na tulong para saigas ng ari na higit sa 4 na oras, o biglaang pagkawala ng paningin o pandinig.