

# Pelvic Floor Exercises & Bladder Training

Impormasyon para sa Pasyente · Simple, napatunayang unang hakbang para sa pagtagas at biglaang pangangailangan

WARWIKI

Dalawa sa pinaka-epektibong unang hakbang para sa kontrol ng pantog ay hindi nangangailangan ng gamot o operasyon: ang **pelvic floor muscle exercises** (kilala rin bilang Kegels) ay nagpapatibay ng mga kalamnan na nagtataglay ng ihi, at ang **bladder training** ay muling nagsasanay sa pantog na maghintay nang mas matagal sa pagitan ng mga biyahe sa banyo. Sa regular na paggawa, nakakatulong ang mga ito sa pagtagas kapag may diin, biglaang pangangailangang umihi, at madalas na pag-ihi — at libre at ligtas ang mga ito.

## Paano Nakakatulong ang mga Ito

- **Pelvic floor exercises** nagpapatibay ng suporta ng kalamnan sa ilalim ng pantog at urethra, para mas kaunting pagtagas kapag umubo, nagbubuhat, o nag-eehersisyo — at nakakatulong din na pigilan ang biglaan urge.
- **Bladder training** unti-unting nagpapalawak ng oras sa pagitan ng mga biyahe sa banyo, nagpapakalma ng overactive bladder at nagbabawas ng madalas na pag-ihi.

## Paghanap ng Tamang mga Kalamnan

Ang pelvic floor muscles ay ang mga kalamnan na gagamitin ninyo para **ihinto ang daloy ng ihi** o pigilan ang hangin. Higpitin (i-squeeze) at itaas ang mga ito, **nang hindi** kinakapit ang tiyan, puwet, o hita, at **nang hindi hinahawakan ang hininga**. (Huwag magsanay sa pamamagitan ng aktwal na paghinto ng daloy — para lamang ito mahanap ang mga kalamnan.) Kung hindi ninyo mahanap ang mga ito, makakatulong ang isang **pelvic floor physical therapist**, minsan sa pamamagitan ng biofeedback.

## MGA TERMINO

### Pelvic floor

Ang pangkat ng mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, bituka, at (sa mga babae) matris.

### Kegels

Mga squeeze-at-itaas na ehersisyo para sa pelvic floor muscles.

### Bladder training

Unti-unting pagpapalawak ng oras sa pagitan ng mga biyahe sa banyo.

### Urge suppression

Pagpapakalma ng biglaan urge para makarating sa banyo nang walang pagtagas.

### Biofeedback

Isang kagamitan na nagpapakita kung gumagamit ka ng tamang mga kalamnan.

### Pelvic floor PT

Isang therapist na espesyalista sa mga kalamnan na ito.

**GAANO KATAGAL BAGO GUMANA?** Bigyan ito ng oras — karamihan sa mga tao ay napapansin ang pagbabago sa loob ng humigit-kumulang **6–12 linggo** ng regular na pagsasanay, at patuloy itong nagpapabuti sa konsistensya. Tulad ng anumang ehersisyo, nababawasan ang benepisyo kapag tumigil, kaya ang layunin ay gawing pangmatagalang gawi araw-araw.

### Simpleng Pang-araw-araw na Gawi

- 1 **Higpitin (i-squeeze)** ang pelvic floor muscles at hawakan sa bilang na 3–5 segundo, pagkatapos ay ganap na iluwag sa parehong tagal ng oras.
- 2 Ulitin nang humigit-kumulang **10 beses**, at gawin ito **3 beses sa isang araw**. Unti-unting palawigin ang pagkakahawak habang lumalaki ang lakas.
- 3 Magdagdag ng ilang **mabilis at malakas na squeeze** upang gamitin bago umubo, bumahing, o magbuhat ("ang knack").
- 4 Ang ganap na pag-iluwag sa pagitan ng mga squeeze ay kasing halaga ng squeeze mismo.

### Bladder Training

- Magtago ng maikling **bladder diary** (talaan ng pagpunta sa banyo) upang makita ang inyong pattern.
- Kapag dumating ang urge, **tumigil, i-squeeze ang pelvic floor, huminga, at hayaang lumipas ang urge** — pagkatapos ay mahinahon na lumakad papunta sa banyo.
- Unti-unting pahabain ang oras sa pagitan ng mga biyahe sa bawat 15 minutong hakbang patungo sa bawat 3–4 oras.

### Kapaki-palamang na Malaman

- Magagawa ninyo ito **kahit saan** — hindi malalaman ng iba.
- Ang konsistensya ay mas mahalaga kaysa intensity; itali ang mga ito sa mga pang-araw-araw na gawi (pagkain, pulang ilaw).
- Kung mayroon kayong **sakit sa pelvic area** o masyadong mahigpit na pelvic floor, ang layunin ay maaaring **mag-relax** (hindi magpalakas) — tanungin ang inyong team.

#### Tanungin ang inyong care team kung:

- Hindi ninyo masabi kung gumagamit kayo ng tamang mga kalamnan
- Ang mga ehersisyo ay **nagpapalala ng sakit** o presyon
- Walang pagbababo pagkaraan ng ilang buwan

### TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang pelvic floor exercises at bladder training ay ligtas, libre, at napatunayang unang hakbang para sa pagtagas, biglaang urge, at madalas na pag-ihi.
2. I-squeeze ang tamang mga kalamnan (nang hindi hinahawakan ang hininga), ganap na iluwag sa pagitan, at sanayin ang pantog na maghintay nang kaunti pang mas matagal.
3. Bigyan ito ng 6–12 linggo at patuloy gawin. Kung lumala ang sakit o hindi ninyo mahanap ang mga kalamnan, magtanong tungkol sa pelvic floor physical therapy.