

Penile Plication

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Operasyon para ituwid ang ari (Peyronie's disease)

Ang Peyronie's disease ay nagdudulot ng peklat (plaque) sa loob ng ari (penis) na nagpapagpakurba nito tuwing mayigas (erection), na maaaring mahirap makaapekto sa pagtatalik. Itinutuwid ng penile plication ang pagkakurba sa pamamagitan ng mga tahi sa mas mahabang gilid ng ari para “i-tuck” ito, na inaayon sa mas maikling gilid. Inilalarawan ng handout na ito kung paano ito gumagana, paano maghanda, at ano ang inaasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Sa Peyronie's disease, nag-iikot ang peklat sa isang gilid ng ari kaya nagpakurba ito tuwing may erection. Itinutuwid ng plication ito sa pamamagitan ng pagtahi at pagpapaikli ng **mas mahabang (labas na) gilid** ng pagkakurba hanggang magkatugma ang dalawang gilid. Walang pinutol na peklat at walang graft — ito ang pinakasimple at pinakamaikli sa mga operasyong pang-ituwid, na may **pinakamababang panganib ng bagong problema sa erection**.

Magandang pagpipilian ito kung:

- Katamtaman lang ang pagkakurba at hindi masyadong kumplikado
- **Maganda ang inyong erection** (kahit may gamot o wala)
- Sapat ang haba ng ari kaya katanggap-tanggap ang kaunting pagpapaikli

Dapat Malaman

Ang pangunahing kapalit ay kaunting **pagpapaikli** ng ari — karaniwang mga 1–2 cm. Madalas na nasosobrahan ang pag-iisip ng mga lalaki; dahil naitutuwid ang pagkakurba, ang magagamit na tuwid na haba ay kadalasang katulad ng dati. Halos **9 sa 10** lalaki ang nakakakuha ng sapat na tuwid na erection para sa pagtatalik. Maaari ninyong **maramdaman ang mga tahi** sa ilalim ng balat (karaniwan, at karaniwang hindi nakakaabala). Ang layunin ay isang ari na sapat na tuwid para sa komportableng pagtatalik, hindi palaging perpektong tuwid.

MGA TERMINO

Peyronie's disease

Peklat sa loob ng ari na nagpapagpakurba nito tuwing may erection.

Plaque

Ang tipak ng peklat na nagdudulot ng pagkakurba.

Plication

Pagpapatuwid ng ari sa pamamagitan ng pagtahi at pagpapaikli ng mas mahabang gilid.

Artificial erection

Erection na ginawa sa operating room (sa pamamagitan ng injection) para masukat at masuri ng siruhano ang pagkakurba.

Circumcision

Pag-alis ng balat ng ari — maaaring isagawa nang sabay kung hindi pa kayo circumcised.

Vacuum device

Pump na maaaring gamitin habang gumagaling para mapanatili ang haba at erection.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nagpapalaya sa sakit habang nasa operasyon.

MASAKIT BA? Isinasagawa sa ilalim ng general, spinal, o local anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, namamaga, may pasa, at masakit ang ari sa loob ng 1–2 linggo — nakakatulong ang yelo, supportive na underwear, at gamot sa sakit. Maikli ito (mga isang oras), karaniwang outpatient.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general, spinal, o local anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin bago mag-opera (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ihihinto, kasama ang blood thinners).
- Dapat **stable** na ang inyong Peyronie's (hindi na nagbabago ang pagkakurba at sakit sa loob ng ilang buwan) — kukumpirmahin ng inyong siruhano ang tamang oras.
- Huwag manigarilyo**; muna itrato ang anumang impeksiyon, at bibigyan kayo ng antibiotics. Kung hindi pa kayo circumcised, maaaring isagawa ito nang sabay — tanungin ang inyong siruhano.

Ipaalam sa inyong care team **nang maaga kung kayo ay:**

- May **mahinang erection** o umiinom ng gamot para sa erection
- Umiinom ng blood thinner, o may nakaraang operasyon sa ari

Ano ang Nangyayari sa Operasyon

- Natutulog o manhid kayo sa ilalim ng anesthesia, at binibigyan ng antibiotics.
- Ginagawa ang erection sa pamamagitan ng injection** para makita ng siruhano ang pagkakurba, pagkatapos ay nilalagyan ng mga tahi ang mas mahabang gilid para i-tuck at ituwid ang ari.
- Sinusuri ang resulta gamit ang isa pang erection, at isinasara ang balat (maaaring sabay na isagawa ang circumcision kung kinakailangan).

Pagkatapos ng Operasyon

- Gumamit ng yelo, supportive na underwear, at gamot sa sakit; panatilihin malinis ang lugar.
- Kung may catheter, karaniwang inaaalis ito kinabukasan ng operasyon.
- Iwasan ang pagtatalik sa loob ng mga 4–6 linggo** para mabigyan ng oras na gumaling ang tahi.
- Maaaring ipayo ng inyong care team na uminom ng **mababang dosis na gamot para sa erection** at/o gumamit ng **vacuum device** araw-araw habang gumagaling para mapanatili ang haba at erection.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig, o lumalagong pamumula, sakit, pamamaga, o pagtagas sa sugat
- Hindi makaihi
- Matinding o lumalalang pamamaga o sakit, o matinding pagdurugo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Itinutuwid ng plication ang pagkakurba sa pamamagitan ng pagtahi sa mas mahabang gilid ng ari — walang pinutol na peklar o graft. Ito ang pinakasimpleng pang-ituwid, na may pinakamababang panganib sa erection.
- Ang kapalit ay kaunting **pagpapaikli** (1–2 cm), ngunit ang pagpapatuwid ay madalas nagbabalik ng magagamit na haba; ~9 sa 10 ay nakakuha ng sapat na erection.
- Dapat stable muna ang inyong Peyronie's; huwag manigarilyo. Pagkatapos, iwasan ang pagtatalik ~4–6 linggo at sundin ang plano ng paggaling (gamot / vacuum device).