

Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS)

Impormasyon para sa Pasyente · Mahinahong nerve stimulation sa bukung-bukong para sa overactive bladder

WARWIKI

Ang PTNS ay isang paggamot sa opisina, walang gamot, para sa **overactive bladder** — biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at hindi makontrol na pag-ihi. Isang manipis na karayom malapit sa bukung-bukong ang naghahatid ng mahinahong electrical pulses sa **tibial nerve**, na konektado sa mga nerbyong kumokontrol sa pantog. Sa loob ng ilang lingguhang session, napapanatag nito ang mga signal ng pantog.

Paano Ito Gumagana

Ang tibial nerve, malapit sa loob ng bukung-bukong, ay konektado sa mga spinal nerve na nagpapatakbo ng pantog. Ang mahinahong pag-stimulate nito ay nagpapadala ng mga signal na **nagpapabago at nagpapanatag** ng labis na aktibidad ng pantog — binabawasan ang pagkaapurahan at dalas ng pag-ihi. Walang gamot at walang side effect sa buong katawan.

Angkop Ba Ito para sa Akin?

- Magandang pagpipilian kapag hindi na sapat ang mga pagbabago sa pamumuhay at nais ninyong **iwasan ang gamot** (o nagdulot ito ng side effect)
- Walang gamot — kapaki-pakinabang kung hindi kayo makainom ng bladder medicines
- Kailangan ng **dedikasyon sa paulit-ulit na session** para gumana at mapanatili ang epekto

MGA TERMINO

Overactive bladder

Biglaang pangangailangang umihi at madalas na pag-ihi dahil sa labis na pagiging aktibo ng pantog.

Tibial nerve

Isang nerbyo malapit sa bukung-bukong na konektado sa nerve supply ng pantog.

Neuromodulation

Paggamit ng mahinahong electrical signals para payapain ang mga labis na aktibong nerbyo.

Percutaneous

Sa pamamagitan ng balat — gamit ang manipis na karayom na electrode.

Maintenance

Paminsan-minsang follow-up session para mapanatili ang benepisyo.

MASAKIT BA? Karamihan ay nakakaramdam lamang ng mahinahong pangingilig, pulso, o banayad na pagkurba ng mga daliri sa paa — hindi masakit. Tumatagal ang bawat session ng halos **30 minuto** habang komportableng nakaupo kayo, at maaari kayong magmaneho pauwi at agad na bumalik sa normal na gawain.

Ano ang Nangyayari

- 1 Nakaupo kayo na may suporta ang binti; isang **napakamipis na karayom na electrode** ay inilalagay malapit sa loob ng bukung-bukong.
- 2 Isang maliit na device ang naghahatid ng **mahinahong pulso** sa loob ng halos 30 minuto.
- 3 Tinatanggal ang karayom — walang naiiwanang anuman sa pagitan ng mga bisita.

Ang Iskedyul

- Karaniwang **isang lingguhang session sa loob ng 12 linggo** para magsimula.
- Ang karamihang tumutugon ay nagpapatuloy ng **paminsan-minsang maintenance** na session para mapanatili ang benepisyo.
- May makukuhang **implantable** na tibial nerve device sa ilang sentro para sa pangmatagalang stimulation sa bahay.

Mabuting Malaman

- Tapusin ang **buong 12 linggo** — unti-unti lumalaki ang benepisyo sa buong kurso.
- Walang gamot, walang operasyon, at walang panahon ng pagbabawi.
- Kailangan ng patuloy na session; maaaring bumaba ang epekto kung titigil kayo.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Pamumula, pamamaga, o pagtagas sa lugar ng bukung-bukong
- Lagnat, o matinding sakit sa bukung-bukong pagkatapos ng session
- Biglaang pagsama ng mga sintomas ng pantog

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Pinapanatag ng PTNS ang overactive bladder gamit ang mahinahong nerve stimulation sa bukung-bukong — walang gamot, walang side effect sa buong katawan.
2. Karaniwang lingguhang session sa loob ng 12 linggo, pagkatapos ay maintenance sessions; halos 30 minuto ang bawat bisita at hindi masakit.
3. Tapusin ang buong kurso, at mag-plano ng patuloy na maintenance para mapanatili ang benepisyo.