

Perineal Urethrostomy

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Bagong permanenteng butas para sa ihi sa perineum

Ang perineal urethrostomy ay gumagawa ng bagong permanenteng butas para sa ihi sa perineum — ang lugar sa pagitan ng bayag at ng puwit. Ginagawa ito kapag ang urethra ay masyadong makipot, peklat, o nasira para maayos. Pagkatapos, nakaupong umihi kayo sa pamamagitan ng bagong butas na ito sa halip na sa dulo ng ari (penis). Ipinaliwanag ng handout na ito kung paano ito gumagana, kung paano maghanda, at kung ano ang inaasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang **pagsikip ng urethra (stricture)** ay isang peklat, pinipigilan ang daloy ng ihi. Kapag ang pagsikip ay mahaba, paulit-ulit bumabalik, o masyadong nasira ang urethra para ayusin, dininadala ng siruhano ang **malusog na bahagi ng urethra** (sa likod ng pagsikip) sa balat ng perineum at tinatahi nang bukas para makagawa ng bagong, pangmatagalang butas. Lumalabas ang ihi doon.

Ito ay isang **maaasahan at matibay** na solusyon na iniwasan ang mas matagal o paulit-ulit na operasyon — magandang pagpipilian para sa mga kumplikadong stricture, o kung ayaw ninyo ng maraming operasyon.

Dapat Malaman

Ang pangunahing pagbabago ay **nakaupong umihi** kayo sa pamamagitan ng bagong butas; hindi na lumalabas ang ihi sa dulo ng ari. Karamihan sa mga lalaki ay nakakaangkop nang mabuti at nasiyahan. **Nananatili ang ari (penis)** — karaniwang hindi nagbabago ang pakiramdam at orgasmo, at karamihan ay nagpapanatili ng ereksyon (may iilang may pagbabago). Sa paglipas ng panahon, maaaring **pumigot ang butas**; kung mangyari ito, karaniwang nababago ng maliit na pamamaraan.

MGA TERMINO

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Stricture

Peklat na pagsikip ng urethra na humahadlang sa daloy ng ihi.

Perineum

Ang lugar sa pagitan ng bayag at ng puwit, kung saan ginagawa ang bagong butas.

Perineal urethrostomy

Ang operasyon na nagdadala ng urethra sa bagong permanenteng butas sa perineum.

Stoma

Ang bagong butas kung saan lumalabas ang ihi.

Stomal narrowing

Kapag pumipigot ang bagong butas sa paglipas ng panahon — karaniwang naiayos ng maliit na pamamaraan.

Catheter

Malambot na tubo na inilalagay nang isa o dalawang linggo habang gumagaling ang butas.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at pumipigil ng sakit habang nasa operasyon.

MASAKIT BA? Ginagawa ang operasyon sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong nararamdaman. Pagkatapos, namamaga, may pasa, at masakit ang perineum sa loob ng 1–2 linggo — makakatulong ang sitz bath, yelo, at gamot sa sakit. May catheter. Marami ang nakakauwi sa araw din o pagkatapos ng isang gabi.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin sa operasyon (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ihihinto, kasama ang blood thinners).
- Sinusuri ng **urine test** ang impeksiyon (gagamurin muna); bibigyan kayo ng antibiotics. **Huwag manigarilyo** — nagpapabagal ito ng paggaling.
- Ang inyong mga binti ay ilalagay sa stirrups habang nasa operasyon. Maghanda para sa **catheter sa loob ng mga 1–2 linggo** at para sa isang kasama sa uwi.

Sabihin sa inyong team **nang maaga** kung kayo ay:

- Nakatanggap ng **radiation sa pelvis** — mas posibleng pumigot ang bagong butas
- Umiinom ng blood thinner, o may kasalukuyang impeksiyon

Ano ang Nangyayari Habang Nasa Operasyon

- 1 Kayo ay natutulog o nanghihimbing sa ilalim ng anesthesia, na may suporta ang mga binti; binibigyan ng antibiotics.
- 2 Sa pamamagitan ng hiwa sa perineum, hahanapin ng siruhano ang malusog na urethra sa likod ng pagsikip at aalisin o lalaktawan ang may peklat na bahagi.
- 3 Dininadala ang malusog na urethra sa balat at tinatahi nang bukas para mabuo ang malawak na bagong butas; inilalagay ang catheter at isinasara ang sugat.

Pagkatapos ng Operasyon

- Makakatulong ang mainit na sitz bath, yelo, at gamot sa sakit; panatiliing malinis ang lugar.
- Ang **catheter ay nananatili mga 1–2 linggo**, pagkatapos ay aalisin ito ng team. Pagkatapos, **nakaupong umihi** kayo sa bagong butas.
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pag-igting, pagbibisikleta, at pakikipagtalik** sa loob ng ilang linggo; iwasan ang direktang pag-upo sa lugar.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Nahulog o huminto sa pag-agos ang catheter, o **hindi makaihi** pagkatapos alisin ito
- Lagnat o panginginig, o lumalaking pamumula, sakit, pamamaga, o pagtagas sa sugat
- Matinding pagdurugo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang perineal urethrostomy ay gumagawa ng bagong permanenteng butas para sa ihi sa perineum — ginagamit kapag masyadong makipot o nasira ang urethra. Pagkatapos, **nakaupong umihi** kayo.
2. Ito ay matibay at maaasahan, iniwasan ang mas matagal o paulit-ulit na operasyon. **Nananatili ang ari**; karaniwang hindi nagbabago ang pakiramdam, orgasmo, at ereksyon.
3. Asahan ang catheter sa loob ng ~1–2 linggo. Maaaring pumigot ang butas sa paglipas ng panahon — sabihin sa team kung humina ang ihi.