

Plaque Incision and Grafting

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Operasyon para ituwid ang ari (Peyronie's disease)

Ang Peyronie's disease ay nagdudulot ng peklat (plaque) sa loob ng ari (penis) na nagiging sanhi ng pagkukurba nito habang nangangatigas. Sa operasyong ito, ang peklat sa maikling panig ng ari ay pinuputol (at minsan bahagyang tinatanggal) para pakawalan ang kurba, at ang bukas na bahagi ay tinatakpan ng graft. Inilalarawan ng handout na ito kung paano ito gumagana, paano maghanda, at ano ang inaasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang plaque ng peklat ay humihila sa isang panig ng ari, kaya ito ay kumukurba habang nangangatigas. Inilalabas ng operasyong ito ang kurba sa pamamagitan ng pagputol sa peklat sa **maikling (panloob) panig**; nagbubukas ito ng puwang, na tinatakpan ng isang **graft** — manipis na patch (tulad ng collagen patch, donor/animal tissue, o tisyu mula sa inyong sariling katawan). Dahil pinahaba nito ang maikling panig kaysa pinaikli ang mahabang panig, ito ay **napapanatili ang haba ng ari**.

Ginagamit ito kapag:

- Ang kurba ay **matindi o kumplikado** (halimbawa, hugis hourglass o may hinge)
- Mahalaga ang **pagpapanatili ng haba** (ang plication ay magpapaikli nang sobra)
- Ang inyong **erection ay sapat na malakas** para sa operasyong ito

Ano ang Dapat Malaman

Ang kalamangan ay **napapanatili ang haba** (minsan ay bahagyang tumatagal). Ang kapalit ay **mas mataas na panganib ng erectile dysfunction** kaysa sa plication — dahil ang paggawa sa peklat ay maaaring makaapekto sa pagdaloy ng dugo — kaya inaalok lamang ito kapag malakas ang erection. Ang **pamamanhid ng ulo** ng ari ay karaniwan sa simula (maingat na inilalabas ang mga nerve habang operasyon) at karaniwang gumagaling sa loob ng 6–12 buwan. Karamihan sa mga lalaki ay nakakakuha ng tuwid na erection para sa pakikipagtalos.

MGA TERMINO

Peyronie's disease

Peklat sa loob ng ari na nagdudulot ng pagkukurba nito habang nangangatigas.

Plaque

Ang patch ng peklat na nagdudulot ng kurba.

Graft

Manipis na patch na ginagamit para takpan ang puwang pagkatapos pakawalan ang peklat — collagen patch, donor/animal tissue, o tisyu mula sa inyong katawan.

Artificial erection

Erection na ginawa sa operating room (sa pamamagitan ng injection) para masukat at masuri ng siruhano ang kurba.

Circumcision

Pag-aalis ng foreskin — madalas ginagawa sa parehong oras kung hindi pa kayo circumcised.

Penile rehabilitation

Paggamit ng erection pill at/o vacuum device habang nagpapagaling para pangalagaan ang erection at haba.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nagpapawalang-sakit sa inyo habang operasyon.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, namamaga, may pasa, at masakit ang ari sa loob ng 1–2 linggo — nakakatulong ang yelo, suporta, at gamot sa sakit. Mas matagal ito kaysa plication (1.5–3 oras); maaaring manatili ng isang gabi. May catheter na inaalal kinaumagahan.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin sa operasyon (pag-aayuno, at kung aling mga gamot ang ihihint, kasama ang blood thinners).
- Ang inyong Peyronie's ay dapat **stable na** (matagal nang hindi nagbabago ang kurba at sakit), at **sinusuri ang inyong erection** bago — ang operasyong ito ay nangangailangan ng magandang erectile function.
- Huwag manigarilyo**; anumang impeksiyon ay ginagamot muna, at bibigyan kayo ng antibiotics. Kung hindi pa kayo circumcised, madalas ay ginagawa ito sa parehong oras.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga** kung kayo ay:

- Mayroon **mahinang erection**, o nangangailangan ng gamot/injection para sa erection
- Umiinom ng blood thinner, o nagkaroon ng nakaraang operasyon sa ari

Ano ang Nangyayari Habang Operasyon

- Kayo ay natutulog o namamanhid sa ilalim ng anesthesia; binibigyan ng antibiotics.
- Isang **erection ay ginagawa sa pamamagitan ng injection** para ipakita ang kurba; ang balat ay itinaas at ang mga nerve sa itaas ng ari ay maingat na inilalabas.
- Ang peklat sa maikling panig ay **pinutol (at minsan bahagyang tinanggal)** para pakawalan ang kurba, at ang puwang ay tinatakpan ng **graft**; sinusuri ang resulta at isinasara ang balat.

Pagkatapos ng Operasyon

- Ang **pamamanhid ng ulo** ng ari ay karaniwan at gumagaling sa ilang buwan.
- Ang catheter ay karaniwang inaalal kinaumagahan pagkatapos ng operasyon.
- Iwasan ang pakikipagtalik sa loob ng mga 6–8 linggo** para mapagaling ang graft.
- Malamang magsisimula ang team ng **penile rehabilitation** (mababang dosis na erection pill at/o araw-araw na vacuum device) para pangalagaan ang erection at haba.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginig, o lumalaking pamumula, sakit, pamamaga, o drainage sa sugat
- Hindi kayo makaihi
- Matindi o lumalang pamamaga o sakit, o malakas na pagdurugo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Inilalabas ng operasyong ito ang kurba sa pamamagitan ng pagputol ng peklat sa maikling panig at pagtakip ng puwang ng graft — **napapanatili ang haba** at ginagamit para sa matindi o kumplikadong kurba.
- Ang kapalit ay **mas mataas na panganib ng erectile dysfunction** kaysa plication, kaya inaalok lamang kapag malakas ang erection; karaniwan ang pamamanhid ng ulo sa simula at gumagaling ito.
- Dapat stable ang inyong Peyronie's at nasuri ang erection; huwag manigarilyo. Pagkatapos, iwasan ang pakikipagtalik ng ~6–8 linggo at sundin ang penile rehabilitation.