

ProACT Регулируемые баллоны (для мужчин)

Информация для пациента · Два регулируемых баллона для поддержки уретры после операции на простате

WARWIKI

ProACT — небольшой **регулируемый** имплантат для мужчин с недержанием мочи после операции на простате (**стрессовое недержание мочи, SUI**). По обе стороны уретры, прямо под мочевым пузырём, помещают два маленьких силиконовых баллона, которые мягко поддерживают уретру и улучшают удержание мочи. Ключевое преимущество: баллоны можно **настраивать в кабинете врача** после операции — добавляя или убирая немного жидкости до оптимального результата.

Как это действует

После операции на простате мышца, удерживающая мочу, может ослабнуть. Два баллона создают мягкую, регулируемую опору у **шейки мочевого пузыря**, чтобы уретра лучше закрывалась при кашле, подъёме тяжестей или движении — **не** пережимая её полностью. Каждый баллон соединён с маленьким **портом** под кожей мошонки, через который хирург регулирует наполнение.

Подходит ли это мне?

- Вариант при **лёгком или умеренном** недержании после операции на простате
- Подходит, если вы хотите малоинвазивный, **регулируемый, обратимый** метод или не можете перенести искусственный сфинктер мочеиспускательного канала (AUS)
- Менее эффективен при **тяжёлом** недержании; как правило, **не рекомендуется после облучения таза** (меньше успехов, выше риск пролежня баллона)
- Может быть промежуточным шагом — некоторые мужчины впоследствии выбирают AUS

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание

Подтекание мочи при кашле, подъёме тяжестей или физической нагрузке.

Шейка мочевого пузыря

Место, где мочевой пузырь переходит в уретру.

Баллон

Маленький силиконовый баллон, создающий мягкую опору.

Порт

Маленький клапан под кожей мошонки для регулировки баллона.

Титрование

Постепенная настройка объёма жидкости в баллоне при повторных визитах.

AUS

Искусственный сфинктер мочеиспускательного канала — другой имплантат на основе манжеты.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Баллоны устанавливают во время **короткой операции** под анестезией (общей, спинальной или местной с седацией), как правило, в режиме **дневного стационара** через два маленьких прокола — без большого разреза. После операции несколько дней могут беспокоить болезненность и отёк. Последующие офисные коррективы быстры и требуют лишь небольшого укола иглой в порт.

Как это проводят

- 1 Под анестезией, под контролем **рентгена, УЗИ или эндоскопа**, хирург через маленькие проколы устанавливает по одному баллону **с каждой стороны** уретры у шейки мочевого пузыря.
- 2 Соединительные трубки выводят к **двум портам** под кожей мошонки.
- 3 Баллоны поначалу почти пусты и оставляются для заживления.

Настройка устройства

- Через несколько недель врач добавляет немного жидкости через порт в мошонке **в кабинете** — быстрый укол иглой без операции.
- Процедуру повторяют на нескольких визитах до достижения хорошего контроля **без затруднения мочеиспускания**.
- Объём баллонов можно увеличивать или уменьшать в любое время; при необходимости устройство можно **удалить**.

После

- Лёгкая болезненность, отёк или синяки в течение нескольких дней; ненадолго избегайте тяжёлых нагрузок и езды верхом (велосипед, лошадь).
- Недержание улучшается **постепенно** по мере настройки баллонов — не всегда сразу.
- Сообщайте будущим хирургам и специалистам по визуализации о наличии имплантата.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Затруднённое мочеиспускание** или полная задержка мочи (баллон может быть слишком раздут или отёк)
- Повышение температуры, нарастающая боль, покраснение или выделения в области прокола (возможная инфекция)
- Внезапное возобновление недержания или кровь в моче

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. ProACT использует два регулируемых баллона для поддержки уретры и уменьшения недержания после операции на простате — малоинвазивно и обратимо.
2. Устройство устанавливают через маленькие проколы, а затем настраивают в кабинете врача при нескольких визитах через порт в мошонке.
3. Оптимально при лёгком или умеренном недержании без предшествующего облучения; немедленно обращайтесь к врачу при задержке мочи или признаках инфекции.