

Ретроградная уретрография (RUG)

WARWIKI

Информация для пациента · Что нужно знать перед рентгеном уретры

Ретроградная уретрография (RUG) — это короткое рентгеновское исследование, которое позволяет получить снимок уретры (мочеиспускательного канала). В уретру вводится небольшое количество контрастного вещества, которое хорошо видно на рентгене. Это помогает хирургу найти и измерить сужение, рубец или повреждение перед планированием лечения.

Об этом исследовании

Рубцовая ткань или сужение внутри уретры — так называемая **стриктура** — плохо видна на обычном снимке. При RUG уретра заполняется контрастным веществом, которое выглядит белым на рентгене. Это даёт чёткую «карту» просвета уретры.

Врач может назначить RUG, чтобы:

- Выявить сужение или рубец и точно определить его расположение и протяжённость
- Оценить состояние уретры после травмы
- Спланировать операцию по восстановлению уретры
- Проверить, как уретра заживает после вмешательства

Исследование показывает открытый просвет уретры — путь, по которому проходит моча. Оно не предназначено для осмотра почек и не является лечением; это снимок, который определяет дальнейшие действия.

Это безопасно?

Да. RUG — распространённое исследование с низким риском осложнений. Доза рентгеновского облучения невелика, контрастное вещество водорастворимо и выводится с мочой. Большинство пациентов испытывают лишь кратковременный лёгкий дискомфорт. Редкие нежелательные явления — инфекция мочевыводящих путей, небольшое кровотечение или кратковременное затруднение мочеиспускания — обычно незначительны и быстро проходят.

ТЕРМИНЫ

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из мочевого пузыря наружу.

Стриктура

Суженный или рубцово-изменённый участок уретры, замедляющий или блокирующий отток мочи.

Контрастное вещество

Жидкость, выглядящая белой на рентгене, — позволяет увидеть просвет уретры.

Катетер

Тонкая мягкая трубка. При этом исследовании только кончик катетера помещается у входного отверстия — он не вводится глубоко.

Флюороскопия

Вид рентгена, показывающий движение контраста в режиме реального времени.

Меатус

Наружное отверстие уретры на кончике полового члена.

Посев мочи

Анализ мочи для выявления инфекции перед исследованием.

Реконструктивный уролог

Хирург, специализирующийся на восстановлении органов мочевыводящей системы и уретры.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Большинство пациентов ощущают лишь кратковременное давление или жжение при введении контраста, но не острую боль. Медицинский персонал может в любой момент замедлить процедуру — просто сообщите, если вам некомфортно. Исследование занимает около 15–30 минут.

Как подготовиться (до исследования)

Специальной подготовки практически не требуется. В большинстве случаев:

- Можно **есть и пить в обычном режиме** — голодать не нужно, если только врач не скажет иначе.
- Принимайте **обычные лекарства**, если врач не попросил что-либо отменить.
- Как правило, можно **уехать домой самостоятельно**, поскольку седация обычно не применяется.

Сообщите врачу заранее, если вы:

- Когда-либо реагировали на рентгеноконтрастное вещество или йод
- Принимаете антикоагулянты (разжижители крови)
- Имеете признаки инфекции мочевыводящих путей (жжение, повышение температуры, мутная или резко пахнущая моча) — при активной инфекции исследование могут перенести

Вас могут попросить сдать **анализ мочи** для исключения инфекции, а также назначить **антибиотик** до или после исследования для снижения риска инфицирования.

Что происходит во время исследования

- 1 Вы ложитесь на рентгеновский стол, как правило слегка повернувшись на бок. Персонал помогает принять нужное положение.
- 2 Головка полового члена обрабатывается антисептиком. Кончик мягкой трубки вводится **только у входного отверстия**. Небольшой баллончик может быть слегка раздут, чтобы зафиксировать катетер.
- 3 Контрастное вещество медленно вводится в уретру, пока делаются рентгеновские снимки. Вас попросят оставаться неподвижным и дышать спокойно.
- 4 Персонал наблюдает за движением контраста на экране и делает несколько снимков под разными углами. Затем трубка удаляется.

После исследования

- Обычно можно сразу ехать домой и **вернуться к привычной деятельности**.
- В течение суток может ощущаться **лёгкое жжение при мочеиспускании**. Обильное питьё ускоряет вывод контраста и облегчает дискомфорт.
- Возможно небольшое **кровянистое отделяемое из уретры** или розоватая окраска мочи — это нормально и обычно проходит в течение суток.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Затруднённое мочеиспускание или полная его невозможность
- Обильное кровотечение или кровотечение, которое не останавливается
- Боль, которая усиливается, а не проходит

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. RUG — быстрое, безопасное рентгеновское исследование, которое позволяет хирургу увидеть просвет уретры с помощью контраста и спланировать правильное лечение.
2. Специальной подготовки почти не нужно: ешьте, пейте и принимайте обычные лекарства — но сообщите врачу об аллергии на контраст, антикоагулянтах или признаках инфекции мочевыводящих путей.
3. Большинство пациентов ощущают лишь кратковременное давление и сразу уходят домой. Лёгкое жжение или незначительная кровь в моче в течение суток — норма; пейте больше воды.