

Стрессовое недержание мочи — мужчины

Информация для пациента · Недержание после операции на простате — при нагрузке или активности

WARWIKI

Стрессовое недержание мочи (SUI) у мужчин — это подтекание мочи при резком повышении давления в брюшной полости: кашле, вставании, подъёме тяжестей или физической активности. У мужчин оно почти всегда связано с ослаблением сфинктера уретры после операции на простате или лучевой терапии. Нередко состояние улучшается в течение первого года, а при сохранении симптомов доступны высокоэффективные методы лечения.

Об этом состоянии

После удаления простаты основную нагрузку по удержанию мочи берёт на себя **уретральный сфинктер** (клапан, удерживающий мочу), который может оказаться ослабленным. В результате возникает подтекание при нагрузке — от нескольких капель до значительного количества мочи. Это отличается от **ургентного** недержания (внезапный непреодолимый позыв), которое лечится иначе; у некоторых мужчин присутствуют оба вида.

Причины

- **Радикальная простатэктомия** (удаление простаты по поводу рака) — наиболее частая причина
- Другие операции на простате или **лучевая терапия области таза**
- Реже — нарушения иннервации или функции мочевого пузыря

Недержание обычно **наиболее выражено в начале** и постепенно уменьшается по мере заживления и восстановления тонуса мышц тазового дна.

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание

Подтекание мочи при нагрузке: кашле, вставании, подъёме тяжестей.

Сфинктер

Мышечный клапан, удерживающий мочу до произвольного мочеиспускания.

Простатэктомия

Операция по удалению простаты — основная причина мужского SUI.

Тазовое дно

Мышцы, которые тренируют для контроля мочеиспускания.

Тест с прокладками

Подсчёт прокладок в день для оценки объёма подтекания.

Мужской слинг

Поддерживающая конструкция под уретрой при умеренном недержании.

Баллоны ProACT

Два регулируемых баллона у уретры, настраиваемых амбулаторно; минимально инвазивный вариант.

Искусственный уретральный сфинктер

Импантируемое устройство (управляемая манжета) при умеренном–тяжёлом недержании.

СТАНЕТ ЛИ ЛУЧШЕ САМО? Нередко да — недержание после операции на простате обычно уменьшается в течение 6–12 месяцев, особенно при регулярных упражнениях для тазового дна. Если неприятное подтекание сохраняется более года, стоит рассмотреть слинг, регулируемые баллоны или искусственный сфинктер — все эти методы очень эффективны.

Как это диагностируют

- Беседа о том, когда и сколько вы теряете мочи (обычно — **число прокладок в день**)
- **Анализ мочи** и проверка полноты опорожнения мочевого пузыря
- Перед операцией: осмотр уретры (цистоскопия) и при необходимости уродинамическое исследование

Как это лечат (шаг за шагом)

- 1 **Упражнения для тазового дна** (Кегеля) — желательно начать ещё до операции или сразу после, плюс контроль потребления жидкости и веса.
- 2 **Наблюдение** в течение первого года с использованием прокладок по мере необходимости.
- 3 **Мужской слинг** — при стойком лёгком–умеренном недержании (после ненарушенной зоны уретры).
- 4 **Регулируемые баллоны ProACT** — ещё один минимально инвазивный вариант при лёгком–умеренном недержании; два небольших баллона настраиваются амбулаторно за несколько визитов (не применяется после лучевой терапии).
- 5 **Искусственный уретральный сфинктер (AUS)** — золотой стандарт при умеренном–тяжёлом недержании и метод выбора после облучения. У каждого варианта есть отдельный листок-памятка.

Жизнь с SUI у мужчин

- Регулярно выполняйте упражнения для тазового дна — это основа лечения.
- Используйте прокладки или защитное бельё для уверенности в период восстановления.
- Ограничьте потребление жидкости и кофеина вечером, если беспокоит ночное недержание.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Жжение, повышение температуры или **кровь в моче** (возможная инфекция)
- Внезапная **невозможность помочиться**
- Недержание нарастает, а не уменьшается

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Мужское SUI почти всегда обусловлено ослаблением сфинктера после операции на простате или облучения — и обычно улучшается в течение первого года.
2. Упражнения для тазового дна — основа; при стойком недержании мужской слинг или искусственный сфинктер дают очень хороший результат.
3. Подождите до года перед принятием решения об операции. Обращайтесь при повышении температуры, крови в моче или невозможности помочиться.