

Fistule de la symphyse pubienne (Fistule urinaire–os pubien)

WARWIKI

Information pour le patient · Quand l'urine érode l'os pubien, entraînant douleur et infection

Une fistule de la symphyse pubienne (aussi appelée fistule urosymphysaire) est un trajet anormal entre le **tractus urinaire** (col vésical ou urètre) et l'**articulation pubienne** à l'avant du bassin — accompagné habituellement d'une infection osseuse. Elle provoque une douleur pubienne ou inguinale sévère et des difficultés à marcher. Cette affection est rare mais sérieuse ; il existe cependant une prise en charge claire.

À propos de cette affection

L'urine qui s'écoule contre l'os pubien entraîne une infection osseuse (**ostéomyélite**) et la destruction de l'articulation.

Symptômes habituels :

- **Douleur pubienne, inguinale ou pelvienne sévère**, souvent aggravée à la marche
- Difficulté à marcher ou à s'appuyer sur la jambe
- Infections urinaires récidivantes ; parfois fuite d'urine

La douleur est souvent confondue au départ avec de l'arthrite ou un problème orthopédique, ce qui peut retarder le diagnostic.

Causes

C'est presque toujours une complication tardive du **traitement du cancer de la prostate** — notamment la **radiothérapie**, souvent après une intervention antérieure sur le col vésical ou l'urètre. Les tissus irradiés cicatrisent mal, permettant à l'urine d'éroder l'os.

COMPRENDRE LES TERMES

Symphyse pubienne

L'articulation qui relie les deux os pubiens à l'avant du bassin.

Fistule de la symphyse pubienne

Un trajet entre le tractus urinaire et cette articulation/cet os.

Ostéomyélite

Infection de l'os.

IRM

Le meilleur examen pour visualiser l'os et la fistule.

Débridement

Ablation chirurgicale de l'os et des tissus infectés.

Dérivation urinaire

Réorientation de l'urine loin de la zone atteinte, souvent le traitement définitif.

POURQUOI UN TRAITEMENT AUSSI INTENSIF ? Parce que le problème vient de **tissus et d'un os infectés, souvent irradiés, qui cicatrisent mal** : une simple réparation locale échoue presque toujours. Un soulagement durable nécessite d'enlever l'os infecté et de **détourner l'urine de la zone** — c'est pourquoi une dérivation urinaire est souvent recommandée. La bonne nouvelle : cela peut mettre fin à des années de douleur.

Comment on le diagnostique

- **IRM** du bassin (meilleur examen pour l'os) et exploration de l'urètre/de la vessie
- Prélèvements pour identifier l'infection
- Antécédents précis : traitement du cancer de la prostate, radiothérapie, interventions antérieures

Comment on le traite

- 1 **Antibiotiques** pour l'infection osseuse.
- 2 **Chirurgie pour retirer l'os infecté** (débridement) et nettoyer la zone.
- 3 **Dérivation de l'urine** — beaucoup de patients ont finalement besoin d'une **dérivation urinaire** (et parfois de l'ablation de la vessie/de l'urètre endommagés), car les tissus irradiés ne cicatrisent pas autrement.
- 4 **Lambeau de tissu** — du muscle sain ou de l'épiploon peut être apporté pour combler et favoriser la cicatrisation.

La prise en charge est souvent **pluridisciplinaire** (urologie avec chirurgie orthopédique et/ou plastique).

Bon à savoir

- Si vous avez une douleur pubienne inexpliquée après une radiothérapie prostatique, signalez cette affection — elle est facile à méconnaître.
- Une dérivation urinaire peut sembler intimidante, mais c'est souvent ce qui **soulage enfin la douleur** et l'infection.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Fièvre, frissons ou malaise important** (possible extension de l'infection)
- Aggravation de la douleur pubienne/inguinale ou **impossibilité de marcher**
- Impossibilité d'uriner ou saignement abondant

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Une fistule de la symphyse pubienne laisse l'urine éroder l'os pubien, causant une douleur sévère et une infection osseuse — le plus souvent des années après une radiothérapie prostatique.
2. Elle est souvent confondue avec de l'arthrite ; l'IRM établit le diagnostic. Signalez toute radiothérapie antérieure à votre équipe.
3. Le traitement retire l'os infecté et détourne généralement l'urine (dérivation urinaire) — une approche intensive, mais qui peut enfin mettre fin à la douleur.