

حقن الكافرنوسال (ICI) علاج لضعف الانتصاب (ED) يُحقن فيه قدر صغير من الدواء في جانب القضيب بإبرة دقيقة لإحداث الانتصاب. يُستخدم حين لا تُجدي حبوب الانتصاب أو لا تناسب الحالة. قد يبدو مُقلَقاً، لكن الإبرة صغيرة جداً، وأغلب الرجال يشعرون بألم بسيط، وهو من أكثر العلاجات غير الجراحية موثوقيةً.

عن هذا العلاج

يُرخي الدواء (غالباً **alprostadil** أو مزيج مُركَّب يُسمَّى **bimix** أو **trimix**) الأوعية الدموية في أجسام الانتصاب فيندفق الدم إليها. يعمل سواء أحسست بالإثارة أم لا، ويُنتج عادةً انتصاباً خلال نحو **5-15 دقيقة** يستمر قرابة 30-60 دقيقة.

- تُعطى الجرعة الأولى في العيادة لتحديد الكمية المناسبة والتأكد من سلامتها.
- ثم يُعلَّم المريض كيفية الحقن الذاتي في المنزل.
- يؤدي نتائج جيدة حتى حين تفشل الحبوب، بما فيها حالات ما بعد جراحة البروستاتا.

هل هو آمن؟

نعم لأغلب الرجال — حين تُحدَّد الجرعة بعناية. الخطر الأهم هو الانتصاب المطوّل (**priapism**) الذي يتجاوز 4 ساعات وهو حالة طارئة. تشمل الآثار الأخرى ألماً خفيفاً، وكدمات أحياناً، وتكوّن عُقيدات صُلْبَة (ندبات) في مواضع الحقن على المدى البعيد — تتناوب المواضع يُقلل هذا الخطر.

تعلم المصطلحات

ضعف الانتصاب (ED)

صعوبة تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه بما يكفي للجماع.

Intracavernosal

حقن داخل أجسام الانتصاب (corpora cavernosa) في القضيب.

Alprostadil

دواء الحقن الفردي الشائع لضعف الانتصاب.

Trimix / bimix

مزيج مُركَّب من دوائين أو ثلاثة يُستخدم للحقن.

Titration

تحديد الجرعة الصحيحة، ويبدأ عادةً في العيادة.

Priapism

انتصاب يتجاوز 4 ساعات — حالة طبية طارئة.

PDE5 inhibitors

حبوب الانتصاب (كـ **sildenafil**)؛ يُعدّ ICI خياراً حين تفشل.

هل سيؤلم؟ الإبرة دقيقة جداً وتدخل في جانب الجسم القضيبى حيث يشعر أغلب الرجال بوخز طفيف فحسب — لا في الجهة الحساسة العليا أو السفلية. ألم خفيف بعد الحقن أمر شائع، خاصةً مع alprostadil. سيقاب فريقك الطبي جرعتك الأولى للتأكد من الراحة والسلامة.

كيف تستخدمها بأمان

- 1 الجرعة الأولى في العيادة لتحديد الكمية المناسبة — لا تزيد الجرعة بنفسك أبداً.
- 2 احقن في جانب الجسم القضيبى (نحو موضع الساعة 3 أو 9)؛ تجنب الجهة العليا والسفلية، وبذل الجانب في كل مرة.
- 3 اضغط بثبات على موضع الحقن بضع دقائق للحد من الكدمات.
- 4 استخدمه بما لا يتجاوز توجيهات فريقك — عموماً مرة واحدة كل 24 ساعة وثلاث مرات أسبوعياً كحد أقصى.

كيف تستعد

- احفظ الدواء وفق التعليمات (بعض المزيجات تحتاج تبريداً).
- أخبر فريقك عن مميّعات الدم وأي أمراض قلبية.
- يمكنك إحضار شريكك إلى جلسة التدريب إن أعانك ذلك.

اطلب الرعاية الطارئة إذا:

- استمر الانتصاب أكثر من 4 ساعات (priapism) — اذهب إلى الطوارئ فوراً؛ التأخير قد يُسبب ضرراً دائماً
- شعرت بالألم الشديد أو نزيف غزير أو علامات عدوى في موضع الحقن
- أحسست بإغماء أو ألم في الصدر بعد الجرعة

معلومات مفيدة

- احتفظ بمعلومات الجرعة والتوقيت التي يعطيك إياها فريقك.
- أبلغ عن أي عُقيدات صلبة جديدة أو انحناء في القضيب.

ثلاثة أمور تدّكرها

1. يستخدم ICI إبرة دقيقة لحقن الدواء في جانب القضيب، محدثاً انتصاباً مؤقتاً خلال 5-15 دقيقة — خيار فعال حين تفشل الحبوب.
2. تُحدّد جرعتك الأولى في العيادة؛ لا ترفعها بنفسك، بدّل مواضع الحقن، ولا تتجاوز الحدّ المحدد لك.
3. الانتصاب الذي يتجاوز 4 ساعات حالة طارئة — اذهب إلى الطوارئ فوراً.