

الحبال الذكري شريط ناعم من الشبكة يوضع تحت الإحليل (مجرى البول) لعلاج سلس البول — وخاصةً التسرّب عند السعال أو الرفع أو النشاط الذي يعقب جراحة البروستاتا. يرفع الحبال الإحليل ويدعمه لتستطيع التحكم في البول بصورة أفضل. وخلافاً لصمام البول الاصطناعي (AUS)، لا يوجد ما تشغله. تشرح هذه النشرة آلية عمله وكيفية الاستعداد وما الذي تتوقعه.

عن هذه العملية

يُعدّ تسرّب البول عند النشاط أو السعال أو الرفع سلس البول الإجهادي (SUI)، وكثيراً ما يعقب جراحة البروستاتا. يعالجه الحبال بوضع شريط شبكي ناعم تحت الإحليل ورفعه إلى موضعه الطبيعي.

يعمل الحبال على دعم الإحليل لا ضغطه، لذا بعد الشفاء تتبّول بصورة طبيعية — دون ضخّة أو زر أو جهاز تشغيل.

ما تحتاج معرفته

يُعطى الحبال أفضل النتائج عند السلس الخفيف إلى المتوسط لدى الرجال الذين لا يزال لديهم بعض وظيفة العضلة العاصرة، وهو ما يفحصه الجراح مسبقاً. عند السلس الشديد أو إذا تلقّيت إشعاعاً على الحوض، يكون صمام البول الاصطناعي (AUS) الخيار الأنسب في الغالب — سيناقش معك الجراح ما يناسبك. قد يُقلّل الحبال السلس دون أن يوقفه كلياً، وإن لم يكن كافياً يمكن تركيب صمام لاحقاً.

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرّب البول عند النشاط أو السعال أو الرفع.

الإحليل

الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم.

الحبال (Sling)

شريط شبكي ناعم يوضع تحت الإحليل لرفعه ودعمه.

فحص إعادة التوضع

فحص بالمنظار للتأكد من أن رفع الإحليل سيُفيد.

احتباس البول

صعوبة مؤقتة في إفراغ المثانة بعد الجراحة؛ قد تستلزم قسرة لفترة قصيرة.

صمام البول الاصطناعي (AUS)

جهاز بديل بضخّة، يُستخدم عادةً عند السلس الشديد.

التخدير العام

دواء يُبقيك نائماً وغير مؤلم أثناء الجراحة.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام أو النخاعي، فلا تشعر بشيء أثناءها. بعدها تَوَقَّع ألمًا وتورمًا وكدمات في الفخذ والمنطقة بين كيس الصفن والشرج لأسبوعين — تساعد الكمادات الباردة وحزام دعم الصفن ومسكنات الألم. تستغرق الجراحة نحو ساعة ويعود كثير من المرضى إلى المنزل في اليوم ذاته.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- تُجرى تحت التخدير العام أو النخاعي — اتبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وأي أدوية يجب إيقافها، بما فيها مضادات التخثر).
- تحليل البول للكشف عن عدوى (تُعالج أولاً)، وتنظير المثانة للتأكد من أن الحبال سَفيّدة.
- لا تدخن، وتحكّم في وزنك وسكري الدم، وخذ المضادات الحيوية كما وُجّهت — الحبال جهاز شبكي مزروع.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- تلقّيت إشعاعاً على الحوض — قد يكون الحبال أقل فاعلية وقد يكون الصمام الاصطناعي (AUS) خياراً أفضل
- أجريت جراحة سلس بول أو تضيق إحليل سابقاً
- لديك أي عدوى في أي مكان

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 أنت نائم أو مخدّر من الخصر إلى الأسفل، وتُعطى مضادات حيوية.
- 2 عبر شقوق صغيرة في الفخذ والمنطقة بين كيس الصفن والشرج، يمرّر الجراح الشريط الشبكي تحت الإحليل ويرفعه إلى موضعه.
- 3 يُبْنَت الحبال، تُغلق الشقوق، وتوضع قسطرة عادةً لفترة قصيرة.

بعد الجراحة

- تَوَقَّع ألمًا وتورمًا وكدمات في الفخذ والعجان لمدة 1-2 أسبوع.
- استخدم الكمادات الباردة وحزام دعم الصفن ومسكنات الألم.
- تجنّب الرفع الثقيل والإجهاد وركوب الدراجة والجماع لعدة أسابيع (نحو 6 غالباً) — الإجهاد قد يُرخي الحبال قبل التئامه.
- قد تعاني صعوبة مؤقتة في التبول وتحتاج قسطرة لفترة قصيرة؛ عادةً ما تزول.
- واصل استخدام الحفاضات في البداية — يتحسن الوضع تدريجياً خلال الأسابيع التالية. لا يوجد شيء تشقّله؛ بعد الشفاء تتبول بشكل طبيعي.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عجز كامل عن التبول
- حمّى أو قشعريرة، أو احمرار أو ألم أو إفرازات متزايدة في مكان الشق
- ألم متفاقم في الفخذ أو العجان

ثلاثة أمور تذكّرها

1. الحبال الذكري شريط شبكي يوضع تحت الإحليل لرفعه ودعمه، مما يحسّن التحكم في البول بعد جراحة البروستاتا — دون أي جهاز تشغيل.
2. يُعطى أفضل النتائج عند السلس الخفيف إلى المتوسط؛ عند السلس الشديد أو بعد الإشعاع يكون الصمام الاصطناعي (AUS) أفضل — ويمكن تركيبه لاحقاً عند الحاجة.
3. بعد الجراحة تجنّب الرفع الثقيل والإجهاد وركوب الدراجة والجماع لعدة أسابيع لاستقرار الحبال. قد تعاني صعوبة مؤقتة في التبول — اتصل فوراً إن عجزت عن التبول أو ظهرت علامات عدوى.