

دعامة القضيب القابلة للثني — تُعرف أيضاً بالدعامة شبه الصلبة — هي قضيبان مرنان يُزرعان داخل القضيب للرجال الذين لم يستجيب ضعف الانتصاب (ED) لديهم للأدوية أو الحقن أو غيرها من العلاجات. لا يوجد مضخة: تثني القضيب للأعلى عند ممارسة الجنس وللأسفل لإخفائه. تشرح هذه النشرة كيفية عمل الدعامة والاستعداد لها وما تتوقعه.

عن هذا الإجراء

حين لا يستجيب **ضعف الانتصاب (ED)** للأدوية أو جهاز الشفط أو الحقن، تكون الدعامة الخيار الأكثر موثوقية. الدعامة القابلة للثني هي أبسط أنواع الدعامات — قضيبان مرنان بغطاء ناعم يُزرعان داخل القضيب. يبقى القضيب صلباً بما يكفي للجنس في جميع الأوقات، وتحركه بيدك:

- اثنه للأعلى لممارسة الجنس
- اثنه للأسفل لإخفائه تحت الملابس

لأنها لا تحتوي على مضخة أو خزان أو سائل، فهي أبسط استخداماً وأطول عمراً — خيار جيد إذا كان تشغيل المضخة صعباً (مثلاً عند ضعف قوة اليد).

ما يجب معرفته

كسائر دعامات القضيب، هذا قرار دائم: يغيّر زرعها نسيج الانتصاب، لذا لن تعود الانتصابات الطبيعية أو علاجات ED الأخرى (أدوية، حقن) فعالة بعدها. لا تؤثر على التبول أو الإحساس أو النشوة أو القذف. الفارق الرئيسي مقارنةً بالدعامة القابلة للنفخ: يبقى القضيب صلباً دائماً مما يجعل الإخفاء أصعب قليلاً وتبدو أقل طبيعية — لكنها أبسط وأطول أمداً.

تعلم المصطلحات

ضعف الانتصاب (ED)

صعوبة الحصول على انتصاب كافٍ للجنس أو الحفاظ عليه.

دعامة القضيب

جهاز يُزرع في القضيب لتمكين الانتصاب حين تعذرت العلاجات الأخرى.

قابلة للثني / شبه صلبة

دعامة مرنة تُبقي القضيب صلباً؛ تضعها في المكان باليد دون مضخة.

الدعامة القابلة للنفخ

النوع الآخر الرئيسي — مضخة تملؤها وتفرغها؛ أكثر طبيعية لكن أجزاؤها أكثر.

الإخفاء

ثني القضيب للأسفل حتى لا تظهر الدعامة تحت الملابس.

التخدير العام

دواء يُقيّك نائماً وخالياً من الألم أثناء الجراحة.

طول العمر

المتانة — بلا أجزاء سائلة، يقل احتمال التلف أو الفشل.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام أو الشوكي فلا تشعر بشيء أثناءها. بعدها تَوقَّع ألماً وتورماً وكدمات في القضيب وكيس الصفن لأسبوعين — يساعد ارتداء دعامة كيس الصفن والثلج وأدوية الألم. الجراحة قصيرة (غالباً أقل من ساعة) وتُجرى عادةً في نفس اليوم. لا تستخدم الدعامة للجنس حتى يأذن لك الجراح.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- تُجرى تحت التخدير العام أو الشوكي — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام، وإيقاف الأدوية بما فيها مرققات الدم).
- الوقاية من العدوى أمر بالغ الأهمية للدعامة: يجب علاج أي عدوى (بما فيها عدوى البول) أولاً؛ ستستحم بصابون مطهر وستأخذ مضادات حيوية.
- لا تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية، وإذا كنت مصاباً بالسكري فسيحرص فريقك على ضبط سكر الدم جيداً — كلاهما يقلل خطر العدوى.

أخير فريقك مسبقاً إذا كنت:

- مصاباً بالسكري أو بأي حالة تؤثر على التئام الجروح
- خضعت سابقاً لجراحة في الحوض أو القضيب أو للعلاج الإشعاعي أو لزرع دعامة سابقة

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 تكون نائماً أو خيراً من الخصر للأسفل تحت التخدير، وتُعطى مضادات حيوية.
- 2 عبر شقّ صغير واحد، يضع الجراح قضيباً مرناً في كل من الغرفتين داخل القضيب. لا توجد مضخة أو خزان.
- 3 يُغلق الشقّ ويوضع القضيب في وضع الأسفل. قد تُوضع قسطرة لفترة وجيزة.

بعد الجراحة

- تَوقَّع تورماً وكدمات في القضيب وكيس الصفن لمدة 1-2 أسابيع. ارتدّ دعامة كيس الصفن، واستخدم الثلج، وخذ مسكّنات الألم، وابقِ الشقّ نظيفاً وجافاً.
- لا تستخدم الدعامة للجنس حتى يأذن لك الجراح — عادةً بعد نحو 4-6 أسابيع من اكتمال الشفاء.
- بعد الشفاء، لا توجد مضخة لتتعلّمها — فقط اثنِ القضيب للأعلى عند الاستخدام وللأسفل للإخفاء. سيعلمك فريقك الطريقة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة، أو احمرار أو ألم أو تورم أو إفرازات متزايدة في موضع الشقّ
- عجز عن التبول
- ألم شديد أو متفاقم، أو لاحظت أن القضيب يبدو داكن اللون

ثلاثة أمور تدّكرها

1. الدعامة القابلة للثني قضيبان مرنان في القضيب — اثنه للأعلى للجنس وللأسفل للإخفاء. لا مضخة؛ إنها الأبسط استخداماً والأطول عمراً.
2. هذا قرار دائم (لن تعود الانتصابات الطبيعية أو الأدوية والحقن فعالة بعدها)، لكنها لا تؤثر على التبول أو الإحساس أو النشوة أو القذف.
3. الوقاية من العدوى أهم شيء: عالج أي عدوى أولاً، لا تدخن، اضبط السكري، واستخدم غسول التطهير والمضادات الحيوية. لا تستخدمها للجنس حتى يأذن لك الجراح (~4-6 أسابيع).