

التبول الليلي (Nocturia) يعني الاستيقاظ من النوم مرةً أو أكثر للتبول. وهو شائع جداً خاصةً مع التقدم في العمر، لكنه ليس أمراً لا مفر منه — إذ يُعطل النوم، ويسبب الإرهاق خلال النهار، ويزيد من خطر السقوط ليلاً. معظم الأسباب قابلة للعلاج متى تم تحديدها.

عن هذه الحالة

ثمة ثلاثة أسباب رئيسية تجعل الناس يستيقظون للتبول، وكثيرٌ من المرضى لديهم مزيج منها:

- إنتاج كميات كبيرة من البول ليلاً (كثرة البول الليلية) — بسبب السوائل المسائية، أو الكافيين أو الكحول، أو تورّم الساقين، أو مشكلات القلب أو الكلى، أو انقطاع النفس أثناء النوم، أو مدرّات البول.
- مثانة ذات سعة أقل — بسبب فرط نشاط المثانة (OAB) أو تضخم البروستاتا.
- اضطراب النوم — تستيقظ لسبب آخر ثم تقرر التبول.

لماذا يستحق الاهتمام

بعيداً عن رداءة النوم، يُعدّ الاستيقاظ ليلاً من أبرز أسباب **السقوط والكسور** لدى كبار السن. ولأن التبول الليلي يُشير في الغالب إلى مشكلة قابلة للعلاج (وأحياناً إلى انقطاع النفس أو مشكلات قلبية)، فمن الأفضل تقييمه لا تجاهله.

تعلم المصطلحات

Nocturia

الاستيقاظ من النوم للتبول.

كثرة البول الليلية

إنتاج نسبة كبيرة من البول اليومي خلال الليل.

مخطط التكرار والحجم

يومية تُسجل فيها توقيت التبول وكميته ليلاً ونهاراً.

فرط نشاط المثانة

مثانة تُعطي إشارات إلحاح متكررة وتحتجز كميات أقل من البول.

انقطاع النفس أثناء النوم

اضطراب في التنفس أثناء النوم قد يزيد إنتاج البول الليلي.

Desmopressin

دواء يُقلّل البول الليلي في حالات مختارة.

الخطوة الأولى: يومية المثانة الاحتفاظ بمخطط التكرار والحجم لعدة أيام — بتسجيل توقيت الشرب والتبول وكمياتهما ليلاً ونهاراً — هو أكثر إجراء مفيد يمكنك القيام به. يُخبر هذا المخطط فريقك الطبي بأي سبب يُفسر حالتك، مما يُحدد طريقة العلاج المناسبة.

كيف تُشخص

- يومية المثانة ومراجعة عادات الشرب والأدوية والنوم
- فحص البول وتقييم وجود تضخم في البروستاتا أو فرط نشاط المثانة
- فحص تورّم الساقين وانقطاع النفس أثناء النوم وأسباب القلب والكلية عند الحاجة

السلامة ليلاً

- استخدم إضاءة ليلية وأبقِ الطريق إلى الحمام خالياً لتفادي السقوط.
- انهض ببطء، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم.

كيف تُعالج

- 1 عادات المساء — قلّل السوائل والكافيين والكحول في الـ 3-4 ساعات قبل النوم.
- 2 لتورّم الساقين — ارفع ساقيك بعد الظهر، وارنّد الجوارب الضاغطة، وتناول مدرّات البول في وقت مبكر من اليوم (حسب تعليمات الطبيب).
- 3 علاج سبب المثانة — معالجة فرط النشاط أو تضخم البروستاتا.
- 4 دواء مستهدف أو علاج النوم — مثل Desmopressin لزيادة البول الليلية الحقيقية، أو علاج انقطاع النفس.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- دم في البول، أو حرقّة، أو حمّى (احتمال عدوى)
- عند استخدام Desmopressin: غثيان أو صداع أو ارتباك (احتمال انخفاض الصوديوم)
- تورّم أو ضيق في التنفس أو تغيّر كبير في كمية البول

ثلاثة أمور تُذكرها

1. التبول الليلي شائع، يُعطلّ النوم، ويزيد خطر السقوط؛ وله في الغالب سبب قابل للعلاج.
2. تسجيل يومية المثانة لعدة أيام هو الخطوة الأولى الأساسية لتحديد السبب والعلاج المناسب.
3. قلّل سوائل المساء، وعالج تورّم الساقين وسبب المثانة أو النوم، واستخدم إضاءة ليلية لتجنب السقوط.