

مبطلات PDE5 أقراص تُستخدم لعلاج ضعف الانتصاب (ED)، وأحدها (tadalafil) يُخفف أيضاً الأعراض البولية لتضخم البروستاتا. أبرزها: **sildenafil (Viagra)**، و**tadalafil (Cialis)**، و**vardenafil**، و**avanafil**. تساعد الجسم على الانتصاب استجابةً للإثارة — لكنها لا تُحدثه تلقائياً.

كيف تعمل

هذه الأدوية تُرخي الأوعية الدموية في القضيب لتندفق الدم إليه. والأهم أنها تعمل فقط مع الإثارة الجنسية — تحتاج إلى إثارة فعلية؛ القرص لا يُسبب انتصاباً آلياً. كما يُرخي tadalafil عضلات البروستاتا والمثانة، لذا يُحسن تناوله يومياً بجرعة منخفضة تدفق البول.

ما الذي تتوقعه

- **sildenafil / vardenafil / avanafil** تبدأ مفعولها خلال 30–60 دقيقة وتستمر بضع ساعات.
- **tadalafil** أطول مفعولاً (حتى 36 ساعة — خيار "نهاية الأسبوع") أو يُؤخذ بجرعة يومية منخفضة.
- الوجبة الدسمة قد تُؤخر مفعول sildenafil؛ أما tadalafil فلا يتأثر بالطعام.
- قد تحتاج إلى بضع محاولات لإيجاد الجرعة والتوقيت المناسبين.

تعلم المصطلحات

inhibitor PDE5

فئة الأقراص (sildenafil، tadalafil، وغيرها) لعلاج ED.

ضعف الانتصاب (ED)

صعوبة الحصول على انتصاب كافٍ للجماع أو الحفاظ عليه.

النترات (Nitrates)

أدوية القلب والام الصدر التي يُمنع منعاً باتاً دمجها مع هذه الأقراص.

عند الحاجة مقابل يومياً

تُؤخذ قبل الجماع، أو بجرعة منخفضة كل يوم.

BPH

تضخم البروستاتا الحميد؛ يعالج tadalafil أعراضه البولية أيضاً.

الانتصاب المؤلم (Priapism)

انتصاب يستمر أكثر من 4 ساعات — حالة طارئة طبية.

القاعدة الأهم على الإطلاق لا تتناول هذه الأقراص أبداً مع **النترات** (كالنيتروجليسيرين أو isosorbide لآلام الصدر) ولا مع "poppers" (amyl nitrite). هذا الجمع قد يسبب انخفاضاً خطيراً بل مميتاً في ضغط الدم. أخبر كل طبيب أو ممرض بأنك تتناول مثبطات PDE5.

كيف تتناولها

- تناولها وفق التعليمات — قبل الجماع (عند الحاجة) أو يومياً حسب وصفتك.
- sildenafil عند الحاجة، تناوله على معدة شبه فارغة للحصول على أسرع مفعول.
- لا تتناول أكثر من جرعة واحدة في 24 ساعة إلا بتوجيه طبي.

آثار جانبية شائعة

- صداع، احمرار الوجه، احتقان الأنف، عسر الهضم
- آلام الظهر أو العضلات (أكثر مع tadalafil)
- صبغة زرقاء عابرة في الرؤية (sildenafil / vardenafil)

أمان مهم

- لا نترات ولا poppers — بناتاً (انظر أعلاه).
- احذر عند الجمع مع حاصرات ألفا وأدوية ضغط الدم الأخرى (قد تُسبب دوارة) — سيضبط فريقك الطبي التوقيت أو الجرعة.
- إن كنت تعاني من أمراض قلبية جسيمة، تأكد مع طبيبك أن ممارسة الجنس وهذه الأقراص آمنة لك.
- حدّ من تناول الكحول الذي يُضاف إلى الدوار.

اطلب الرعاية الطارئة إذا كان لديك:

- انتصاب يستمر أكثر من 4 ساعات (priapism)
- فقدان مفاجئ للبصر أو السمع — أوقف القرص وتوجّه للرعاية فوراً
- ألم في الصدر، إغماء، أو دوّار شديد

ثلاثة أمور تنكّر لها

1. مثبطات PDE5 تُساعدك على الانتصاب مع الإثارة (لا تعمل وحدها)؛ و tadalafil يُحسن أيضاً الأعراض البولية للبروستاتا.
2. لا تدمجها أبداً مع النترات أو poppers — انخفاض ضغط الدم قد يكون مميتاً.
3. اطلب الرعاية الطارئة عند انتصاب يتجاوز 4 ساعات، أو فقدان مفاجئ للبصر أو السمع.