

Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase (Comprimés pour réduire la prostate)

WARWIKI

Information pour le patient · Comprimés qui réduisent progressivement une prostate hypertrophiée

Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase sont des comprimés qui **réduisent progressivement une prostate hypertrophiée (HBP)**, améliorant le débit urinaire et diminuant le risque de rétention urinaire et de chirurgie de la prostate. Les deux médicaments de cette classe sont **finasteride (Proscar)** et **dutasteride (Avodart)**. Leur effet est graduel — attendez-vous à plusieurs mois avant d'en ressentir le bénéfice.

Comment ça fonctionne

Ces comprimés bloquent la conversion de la testostérone en **DHT**, l'hormone qui stimule la croissance de la prostate. Avec moins de DHT, la prostate **réduit progressivement de taille**, ce qui élargit le canal urinaire. Ce processus prend du temps : le bénéfice complet apparaît en **3 à 6 mois** — ce n'est pas un traitement à effet rapide et ils sont souvent associés à un alpha-bloquant à action rapide.

À quoi s'attendre

- Plus efficaces pour les prostates **volumineuses** ; le bénéfice s'installe sur plusieurs mois.
- À prendre **une fois par jour**, sur le long terme.
- Avec le temps, ils réduisent le risque de **rétention urinaire** et le besoin de chirurgie de la prostate.

COMPRENDRE LES TERMES

5-ARI

Inhibiteur de la 5-alpha-réductase (finasteride, dutasteride).

HBP

Hypertrophie bénigne de la prostate — une prostate hypertrophiée.

DHT

Hormone qui stimule la croissance de la prostate ; ces comprimés la diminuent.

PSA

Analyse sanguine de la prostate ; ces comprimés divisent environ par deux ce résultat.

Rétention urinaire

Incapacité à vider la vessie — ce risque est réduit avec le temps.

Finasteride / dutasteride

Les deux médicaments de cette classe.

EFFET SUR VOTRE TEST PSA Ces comprimés abaissent votre **taux de PSA d'environ la moitié**. Cela ne vous est pas nuisible, mais votre médecin doit le savoir pour interpréter correctement le dépistage du cancer de la prostate — en général, votre résultat de PSA est **multiplié par deux** pour être comparé aux valeurs normales. Informez chaque professionnel de santé que vous prenez ce traitement.

Comment le prendre

- **Une fois par jour**, à heure régulière ; soyez patient — le bénéfice prend des mois à s'installer.
- Ne cessez pas le traitement parce que vous ne ressentez pas de changement au début.
- Ce traitement est souvent poursuivi à long terme pour maintenir la prostate à taille réduite.

Sécurité — points essentiels

- **Les femmes enceintes ne doivent pas manipuler** des comprimés écrasés ou cassés (risque pour un fœtus masculin) ; le comprimé entier enrobé peut être manipulé sans danger.
- **Ne donnez pas votre sang** pendant le traitement ni pendant une période après son arrêt.
- Signalez à votre équipe tout **changement d'humeur ou état dépressif**, des cas ayant été rapportés.

Effets secondaires courants

- Diminution de la libido, difficultés d'érection ou réduction du volume d'éjaculat
- Sensibilité ou augmentation du volume des seins
- Certains hommes signalent des effets sexuels persistants — parlez-en à votre équipe

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une **grosseur au sein**, douleur ou écoulement du mamelon
- Une **dépression** ou des changements d'humeur
- Une impossibilité d'uriner (consultez en urgence)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Les 5-ARI réduisent progressivement la prostate pour améliorer le débit urinaire et diminuer le risque de rétention et de chirurgie — attendez 3 à 6 mois.
2. Ils **divisent votre PSA environ par deux** — assurez-vous que votre médecin en tient compte lors du dépistage du cancer de la prostate.
3. Les femmes enceintes ne doivent pas manipuler des comprimés cassés, ne donnez pas votre sang pendant le traitement. Signalez tout changement mammaire ou état dépressif.