

Pénis enfoui acquis & sa correction

WARWIKI

Information pour le patient · Quand le pénis devient caché, et comment la chirurgie le restaure

Le pénis enfoui acquis survient quand le pénis devient **caché sous la peau et la graisse** du bas-ventre, du scrotum ou de la cuisse chez l'adulte. Il peut provoquer des problèmes d'hygiène, des infections cutanées répétées, une difficulté à uriner debout et des troubles sexuels. Il s'agit d'un problème reconstructif reconnu et traitable — la chirurgie peut libérer et restaurer le pénis.

À propos de cette affection

« Acquis » signifie qu'il s'est développé à l'âge adulte (contrairement au pénis enfoui bénin que certains enfants présentent). Les causes fréquentes comprennent la **prise de poids** et un tablier graisseux abdominal important, des cicatrices après une circoncision ou une chirurgie antérieure, un gonflement cutané chronique (**lymphœdème**) et une maladie cutanée cicatricielle appelée **lichen scléreux**.

La situation tend à entretenir un cercle difficile :

- La peau piégée reste humide et s'**infecte et s'enflamme**.
- Les projections d'urine sur la peau piégée aggravent l'irritation et les cicatrices.
- Cela rend l'hygiène, la miction et la sexualité de plus en plus difficiles.

Pourquoi la correction aide

La chirurgie vise à **libérer le pénis**, retirer la peau atteinte et reconstituer une couverture saine afin que vous puissiez uriner debout, rester propre et reprendre vos activités normales — la satisfaction après la correction est généralement élevée.

COMPRENDRE LES TERMES

Pénis enfoui (caché)

Le pénis dissimulé sous la peau et la graisse environnantes.

Panniculectomie

Ablation du tablier graisseux/cutané du bas-ventre.

Escutcheonectomie

Ablation du coussin graisseux situé juste au-dessus du pénis.

Grefe de peau

Peau saine déplacée pour recouvrir le corps du pénis.

Lichen scléreux

Maladie cutanée cicatricielle pouvant en être la cause ou l'aggraver.

Lymphœdème

Gonflement cutané chronique pouvant enfouer le pénis.

DEVRAI-JE D'ABORD PERDRE DU POIDS ? Souvent, oui — en cas de pénis enfoui lié au poids, la **perte de poids** (parfois avec une orientation vers la chirurgie bariatrique) améliore les résultats et leur durabilité ; votre équipe peut donc vous le conseiller avant ou en même temps que la chirurgie. L'intervention elle-même permet généralement de **retirer le tablier graisseux** en même temps.

Comment se déroule la correction

- 1 Le pénis est **libéré** des cicatrices et des tissus qui le retiennent.
- 2 La peau malade ou cicatricielle est retirée ; le corps du pénis est souvent recouvert d'une **greffe de peau**.
- 3 Le tablier graisseux est enlevé (**panniculectomie / escutchéonectomie**) ; le scrotum peut être remodelé.
- 4 L'intervention est parfois réalisée en **plusieurs étapes** ; une sonde urinaire et des drains sont habituels.

Comment vous préparer

- **Optimisation du poids** (éventuelle orientation bariatrique) et **arrêt du tabac** — ces deux points influencent fortement la cicatrisation.
- Traitez toute infection cutanée active au préalable ; suivez les consignes d'anesthésie.
- Prévoyez de l'aide à domicile et un arrêt de travail — la convalescence est significative.

Après la chirurgie

- Prévoyez une **hospitalisation**, une sonde urinaire et des drains pour un certain temps.
- Si une greffe a été posée, **protégez-la** — évitez de vous asseoir ou d'exercer une pression sur la zone selon les instructions.
- Soins de plaie et reprise progressive des activités ; contrôler son poids protège le résultat.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Fièvre, rougeur qui s'étend ou écoulement malodorant (infection)
- Greffe ou plaie qui noircit, qui s'ouvre ou saignement important
- Vous **ne pouvez pas uriner** ou la sonde ne draine plus

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le pénis enfoui acquis cache le pénis sous la peau et la graisse, causant des problèmes d'hygiène, de miction, d'infections et de sexualité — et il est corrigé.
2. La correction libère le pénis, retire la peau atteinte (souvent avec une greffe de peau) et enlève le tablier graisseux ; elle peut se faire en plusieurs étapes.
3. La perte de poids et l'arrêt du tabac améliorent nettement les résultats. Appelez votre équipe en cas de fièvre, de greffe qui noircit ou de difficulté à uriner.