

# Alpha-bloquants (pour la prostate / le flux urinaire)

Information pour le patient · Comprimés qui détendent le col vésical pour améliorer le flux urinaire

WARWIKI

Les alpha-bloquants sont des comprimés qui **détendent le muscle** de la prostate et du col vésical pour faciliter la miction — premier traitement habituel des symptômes urinaires liés à une **hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)**. Les plus courants sont la **tamsulosine (Flomax)**, **l'alfuzosine, la silodosine, la doxazosine et la térazosine**. Ils agissent rapidement mais ne réduisent pas la taille de la prostate.

## Comment ça fonctionne

Une prostate hypertrophiée comprime le canal urinaire. Les alpha-bloquants **détendent ce muscle au niveau du col vésical**, ce qui améliore le jet, réduit les hésitations, les efforts à la miction et les interruptions. Ils traitent les **symptômes** — ils ne modifient pas la taille de la prostate, donc le bénéfice dure seulement pendant le traitement.

## À quoi s'attendre

- L'amélioration est généralement **rapide** — en quelques jours à quelques semaines.
- Souvent pris **une fois par jour** ; la tamsulosine se prend environ **30 minutes après le même repas** chaque jour.
- La doxazosine/térazosine sont débutées **au coucher** et augmentées progressivement pour limiter les étourdissements.
- Elles peuvent être associées à un médicament qui réduit la prostate pour les prostates plus volumineuses.

## COMPRENDRE LES TERMES

### Alpha-bloquant

Un comprimé qui détend le muscle au col vésical.

### HBP

Hypertrophie bénigne de la prostate — une prostate élargie.

### Col vésical

L'orifice musculaire où la vessie rejoint l'urètre.

### Éjaculation rétrograde

Le sperme remonte dans la vessie — sans danger, mais le volume éjaculé est réduit ou nul.

### Hypotension orthostatique

Étourdissements dus à une chute de la tension artérielle en se levant.

### IFIS

Syndrome de l'iris flasque peropératoire lors de la chirurgie de la cataracte — signalez-le à votre ophtalmologiste.

**CHIRURGIE DE LA CATARACTE PRÉVUE ?** Informez votre ophtalmologiste que vous prenez (ou avez déjà pris) un alpha-bloquant — il peut rendre l'iris “flasque” pendant l'intervention (syndrome de l'iris flasque peropératoire, IFIS), et l'équipe se préparera en conséquence. Cela est important **même si vous avez déjà arrêté** le médicament.

## Comment le prendre

- Prenez-le **à la même heure chaque jour** selon les instructions (tamsulosine ~30 min après un repas).
- Pour la doxazosine/térazosine, prenez la **première dose au coucher** et levez-vous lentement — la chute initiale de tension artérielle peut causer des étourdissements.
- Ne doublez pas la dose si vous en oubliez une.

## Sécurité — points essentiels

- Levez-vous **lentement**, surtout au début, pour éviter les étourdissements ou les évanouissements.
- Soyez prudent en cas d'association avec des **inhibiteurs de la PDE5** ou des médicaments antihypertenseurs (risque accru d'étourdissements).
- L'**éjaculation rétrograde** (éjaculat réduit ou absent) est fréquente avec la tamsulosine/silodosine — sans danger et réversible à l'arrêt du traitement.

## Effets secondaires courants

- Étourdissements ou vertiges ; fatigue
- Nez bouché
- Éjaculation réduite ou “sèche”

### Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Un **évanouissement** ou des étourdissements sévères
- Des palpitations, un cœur qui s'emballer ou une douleur thoracique
- Une **impossibilité totale d'uriner** (consultez en urgence)

## TROIS CHOSES À RETENIR

1. Les alpha-bloquants détendent rapidement le col vésical pour améliorer le flux urinaire dans l'HBP — ils soulagent les symptômes mais ne réduisent pas la prostate.
2. Levez-vous lentement au début (tension artérielle basse) et sachez qu'une éjaculation réduite ou sèche est fréquente et sans danger.
3. Signalez toujours à votre **ophtalmologiste** avant une chirurgie de la cataracte que vous prenez ou avez pris un alpha-bloquant.