

Bilan urodynamique ambulatoire (Sans sonde)

WARWIKI

Information pour le patient · Un test vésical sans fil effectué dans votre quotidien

Il s'agit d'une méthode plus récente pour évaluer le fonctionnement de votre vessie sans sonde. Un petit capteur sans fil est placé dans la vessie et mesure la pression pendant que vous buvez, bougez et vaquez à vos occupations — le test reflète ainsi le comportement réel de votre vessie, et non un court instantané en clinique.

À propos de cet examen

Un bilan urodynamique standard utilise des sondes et remplit la vessie avec du liquide en clinique. Cet examen est différent :

- Un petit **capteur souple en anneau** est introduit dans la vessie par l'urètre — l'opération prend moins d'une minute avec un gel anesthésiant.
- Vous portez un petit **récepteur sans fil** qui enregistre les mesures.
- Votre vessie se remplit **naturellement au fil de vos boissons**, et vous **urinez normalement** avec le capteur en place.

Parce qu'il suit votre activité quotidienne réelle, cet examen est utile lorsqu'un test standard était inconfortable ou peu concluant, ou lorsque les symptômes sont intermittents. Il fournit aussi des mesures plus fidèles à la réalité quand un cathéter ordinaire perturberait la vidange.

Est-ce sans danger ?

Les premiers résultats sont prometteurs. Le capteur est conçu pour rester en place pendant la miction sans bloquer le jet, et aucun problème grave n'a été observé dans les études initiales. Les risques sont comparables à ceux d'un sondage bref : légère brûlure et faible risque d'infection urinaire. Notez que ce dispositif mesure uniquement la pression vésicale et ne remplace pas tous les volets d'un bilan urodynamique complet.

COMPRENDRE LES TERMES

Ambulatoire

Réalisé pendant vos déplacements et activités normales, sans rester allongé en clinique.

Capteur

Le petit dispositif en anneau placé dans la vessie pour mesurer la pression.

Récepteur sans fil

Un petit boîtier que vous portez sur vous et qui enregistre les données du capteur.

Sans sonde

Aucun tube ne reste en place pendant l'examen, contrairement au bilan urodynamique standard.

Remplissage naturel

La vessie se remplit d'elle-même au fil de vos boissons, sans injection de liquide.

Uriner

Vider la vessie — vous le faites normalement avec le capteur en place.

Journal mictionnel

Un relevé simple de vos boissons et mictions que l'équipe peut vous demander de tenir.

Bilan urodynamique

Examens qui mesurent comment la vessie stocke et évacue l'urine.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La mise en place du capteur ne prend que quelques secondes avec un gel anesthésiant et donne une sensation de brève pression. La plupart des patients ne sentent presque rien ensuite et peuvent se déplacer et uriner normalement. Le retrait est rapide : le capteur est doucement retiré par l'urètre grâce à un petit fil.

Comment vous préparer (Avant l'examen)

- Il y a très peu à faire. Venez prêt à **boire des liquides et à rester pour la durée de surveillance** que votre équipe vous indique.
- Prenez vos **médicaments habituels**, mais demandez si vous devez suspendre les médicaments vésicaux.
- Si on vous le demande, **tenez un journal simple** de vos boissons et mictions pendant l'examen.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez des signes d'**infection urinaire** (brûlures, fièvre ou urines troubles à l'odeur forte) — une infection active peut nécessiter de reporter l'examen
- Prenez un anticoagulant ou avez des allergies

Déroulement de l'examen

- 1 L'orifice est nettoyé et un gel anesthésiant est appliqué.
- 2 Le petit capteur en anneau est doucement introduit dans la vessie par l'urètre, et vous enfitez le récepteur sans fil.
- 3 Vous buvez des liquides et vous déplacez normalement pendant que le capteur enregistre ; vous urinez normalement quand vous en ressentez le besoin.
- 4 Une fois la période de surveillance terminée, le capteur est retiré doucement par son fil.

Après l'examen

- Vous pouvez reprendre vos **activités normales immédiatement**.
- Vous pouvez ressentir de **légères brûlures en urinant** pendant un ou deux jours. Boire plus d'eau aide à atténuer cette gêne.
- Vous pouvez remarquer une **légère teinte rosée** dans les urines brièvement. C'est fréquent et disparaît généralement en une journée.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Des difficultés à uriner ou une impossibilité totale d'uriner
- Des saignements abondants ou des caillots dans les urines
- Une douleur qui s'aggrave au lieu de s'améliorer

TROIS CHOSES À RETENIR

1. C'est un examen vésical sans fil et sans sonde — un petit capteur enregistre le comportement de votre vessie au cours de votre journée normale.
2. Peu de préparation est nécessaire. Venez prêt à boire et à rester pour la surveillance, tenez un journal si demandé, et signalez tout signe d'infection à votre équipe.
3. La pose et le retrait prennent quelques secondes, et vous rentrez chez vous immédiatement. De légères brûlures ou une urine légèrement rosée pendant un jour sont normales — buvez plus d'eau, et appelez en cas de fièvre, saignement abondant ou difficulté à uriner.