

口腔黏膜（面頰）移植組織

WARWIKI

病人須知 · 用嚟重建你尿道或輸尿管嘅面頰移植組織

喺你嘅重建手術中，外科醫生會取用你面頰內壁一小塊濕潤嘅口腔黏膜 — 即口腔黏膜移植組織 (graft) — 嚟重建你嘅尿道，或者（較少情況）修復由腎臟接駁到膀胱嘅輸尿管。呢份資料解釋點解要用面頰組織、手術點做、以及你嘅口腔會有咩感覺同點樣康復。

關於呢個移植組織

你面頰內壁係一層堅韌、濕潤嘅組織，同尿道環境非常相似。外科醫生會從一邊面頰（如需較長修復則用兩邊）取出一小塊橢圓形組織，用嚟擴寬或重建尿道狹窄嘅位置。移植組織係喺你熟睡嘅情況下，同一個手術中取出嘅。

點解用面頰內壁？

- 冇毛、天生習慣潮濕環境，同尿道相似
- 堅韌、癒合快、疤痕少，亦較少感染
- 喺同一個手術中取出 — 唔需要另外切口，口腔外冇可見疤痕

安唔安全？

安全。取用面頰黏膜係尿道手術中成熟而耐受性良好嘅一部分，病人滿意度好高。外科醫生會避開負責分泌唾液嘅腮腺管同嘴角。大部分影響係口腔方面 — 酸痛、緊繃或麻木 — 通常喺頭一兩個星期內改善。用兩邊面頰會較痛，只有修復較長時先用。

詞彙解釋

口腔黏膜 (Buccal mucosa)

面頰內壁濕潤嘅黏膜層。

移植組織 (Graft)

從自己身體取出、用嚟修復另一個位置嘅組織。

尿道 (Urethra)

將尿液排出體外嘅管道。

尿道成形術 (Urethroplasty)

修復或重建尿道嘅手術；口腔黏膜移植係其中一部分。

取材位置 (Donor site)

取出移植組織嘅地方 — 即你嘅面頰內壁。

全身麻醉 (General anesthesia)

令你喺手術期間熟睡、唔感到痛嘅藥物。

腮腺管 (Parotid duct)

面頰內引流唾液嘅小開口；外科醫生會避開佢。

張口困難 (Trismus)

暫時性口腔緊繃或難以大開口；輕柔伸展有助改善。

會唔會痛？ 取移植組織時你係喺全身麻醉下熟睡，手術期間唔會有感覺。手術後面頰會酸痛 — 感覺似咬傷口腔或口腔潰瘍 — 並可能覺得緊繃或麻木。酸痛感通常喺頭 1-2 個星期內改善，面頰會繼續癒合數個星期。大部分人術後一日內可飲流質，一個星期內可食正常飲食。

點樣準備（手術之前）

- 移植組織係喺你嘅重建手術中一同取出，**喺全身麻醉下進行** — 請跟從所有標準手術指示（禁食及需要暫停嘅藥物）。
- **保持口腔清潔** — 認真刷牙漱口；醫療團隊可能會要求你事先做牙科清潔。
- **唔好吸煙、電子煙或使用煙草** — 會減慢口腔同移植組織嘅癒合。手術前戒掉大有幫助。

請提早告知你嘅醫療團隊，如果你：

- 曾接受口腔、面頰或下顎手術，或頭頸部放射治療
- 有口腔疾病，或難以大開口
- 有咀嚼煙草或檳榔習慣，或有持續牙科問題

手術過程中會發生咩事

- 1 整個手術期間你係熟睡喺全身麻醉下，口腔會輕輕撐開。
- 2 外科醫生從一邊面頰（如修復較長則用兩邊）取出一小塊橢圓形黏膜，避開腮腺管同嘴角。
- 3 移植組織經修整後用嚟擴寬或重建尿道狹窄嘅位置。
- 4 面頰切口通常自然癒合，或以可溶解縫線縫合。

手術之後（你嘅口腔）

- **康復分兩個階段：酸痛同緊繃感喺頭 1-2 個星期內改善**，但面頰需要約一個月先完全癒合，麻木感可能需要一個月或以上先消退。
- 初期食軟身、清淡嘅食物；避免辛辣、酸性、過熱或硬脆食物及酒精。食完後輕輕漱口。
- 每日輕柔地張開口腔做伸展，有助減輕緊繃感。口腔外冇可見疤痕。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷
- 口腔持續或大量出血
- 口腔痛楚加劇、腫脹或有膿（感染跡象）
- 完全唔能夠飲水或張口

要記住嘅三件事

1. 面頰內壁一小塊濕潤黏膜用嚟重建你嘅尿道 — 冇毛、癒合好，口腔外冇可見疤痕。
2. 移植組織係喺你熟睡嘅尿道修復手術中同時取出。準備方面：跟從禁食及藥物指示，保持口腔清潔，唔好吸煙。
3. 你嘅面頰會酸痛、緊繃或麻木 — 頭 1-2 個星期改善，但需要一個月或以上先完全康復。食軟餐、輕柔漱口、每日張口伸展。如有發燒、大量出血或腫脹加劇，請即聯絡醫療團隊。