

陰道子宮切除術（治療脫垂）

WARWIKI

病人須知 • 經陰道切除子宮，同時提升陰道頂部

當子宮因盆腔器官脫垂而下移，其中一個選擇係做 **陰道子宮切除術** — 經陰道切除子宮，唔需要腹部切口。手術通常同時做陰道頂部的懸吊固定（及其他修補），令盆底得到妥善支撐。

關於呢個手術

子宮經陰道分離並取出。之後將**陰道頂部懸吊**固定喺你自身強韌的盆腔韌帶上，防止日後再脫垂。醫生會按你嘅檢查結果，決定係咪同時修補前壁或後壁。陰道路徑通常比經腹手術**痛楚少、復原更快**。

重要事項

- 切除子宮後，月經會停止，亦唔能夠再懷孕。
- 如果脫垂主要涉及子宮，而你希望**保留子宮**，可以考慮保宮懸吊術（子宮固定術），請問你嘅外科醫生。
- 如有需要，可同時加做**尿失禁**手術。

詞彙解釋

子宮切除術

切除子宮嘅手術。

陰道路徑

經陰道進行，唔需要腹部切口。

陰道頂懸吊

將陰道頂部重新固定，令佢得到支撐。

子宮固定術

保留子宮嘅替代方案，只做懸吊唔切除。

脫垂

盆腔器官下移，引起膨出或壓迫感。

陰道填塞

手術後短暫放入紗布，幫助癒合。

會唔會痛？ 手術係麻醉下進行，過程中你唔會感到痛楚。因為唔需要腹部切口，復原通常比其他子宮切除方式容易。預計會有輕至中度酸痛，大部分人當日或翌日即可回家。

點樣準備

- 跟從**麻醉指示**（禁食、按指示停用薄血藥）。
- 進行術前評估；與醫生討論係咪需要同時修補或加做防漏手術。
- 唔好吸煙；安排人接送及術後在家照顧。

會發生咩事

- 1 麻醉後施打抗生素。
- 2 子宮經陰道分離並取出。
- 3 陰道頂部懸吊固定喺韌帶上；按計劃完成其他修補。
- 4 短暫放置尿管，有時亦會放置陰道填塞。

之後

- 陰道頂部癒合期間，輕微出血或分泌物屬正常，可持續數星期。
- **約 6 星期內避免搬重物、用力及性行為。**
- 保持大便暢通，避免用力；充分休息後逐步恢復活動。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒，或大量出血
- **唔能夠小便**，或盆腔／腹部痛楚加劇
- 分泌物有臭味，或有異物從陰道脫出

要記住嘅三件事

1. 陰道子宮切除術經陰道切除子宮（唔需要腹部切口），並同時懸吊陰道頂部。
2. 手術後月經停止，亦唔能懷孕；如想保留子宮，可問醫生關於保宮懸吊術。
3. 約 6 星期內避免搬重物及性行為；輕微出血屬正常。如發燒、大量出血或排尿困難請即求醫。