

Vòng nâng (pessary) là thiết bị mềm, có thể tháo rời, đặt trong âm đạo để **hỗ trợ sa tạng chậu** — một số loại còn giúp giảm tiểu không kiểm soát khi gắng sức. Đây là lựa chọn an toàn, không phẫu thuật, giúp giảm cảm giác lồi và áp lực. Đối với nhiều người, vòng nâng không chỉ là giải pháp tạm thời mà còn là lựa chọn lâu dài thoải mái.

Tác Dụng

Vòng nâng đặt trong âm đạo, **nâng đỡ các cơ quan bị sa** về đúng vị trí, giảm cảm giác lồi, nặng nề hoặc áp lực vùng chậu. Một số hình dạng còn hỗ trợ niệu đạo, giảm **tiểu không kiểm soát khi gắng sức** như ho hay vận động.

Điều Chỉnh Kích Cỡ

Vòng nâng có nhiều hình dạng và kích cỡ — loại **dạng vòng** phổ biến nhất; các loại khác (như Gellhorn) dùng cho sa tạng nặng hơn. Bác sĩ sẽ **điều chỉnh kích cỡ** ngay tại phòng khám; bạn có thể thử vài cỡ để tìm loại vừa vặn, an toàn và thoải mái. Vòng nâng phù hợp không gây cảm giác khó chịu, không tự rơi ra và không gây đau.

Thường nên dùng kèm **estrogen âm đạo** để giữ cho mô khỏe mạnh.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Vòng nâng (pessary)

Thiết bị âm đạo có thể tháo rời, hỗ trợ sa tạng chậu.

Sa tạng chậu

Khi các cơ quan vùng chậu bị sa xuống, gây cảm giác lồi hoặc áp lực.

Vòng nâng dạng vòng

Loại phổ biến nhất, đơn giản nhất; thường tự quản lý được.

Gellhorn

Vòng nâng dùng cho sa tạng chậu mức độ nặng hơn.

Điều chỉnh kích cỡ

Chọn kích cỡ/hình dạng vừa vặn và thoải mái.

Trợt mô

Vết loét nhỏ có thể xuất hiện nếu không chăm sóc vòng nâng đúng cách — có thể phòng ngừa được.

Estrogen âm đạo

Thường dùng kèm vòng nâng để bảo vệ mô.

TÔI CÓ CẢM THẤY NÓ KHÔNG? CÓ THỂ VẬN ĐỘNG BÌNH THƯỜNG KHÔNG? Vòng nâng được điều chỉnh đúng kích cỡ sẽ không gây cảm giác khó chịu, và bạn có thể vận động bình thường — kể cả tập thể dục. Nhiều người đeo suốt ngày và chỉ tháo ra để vệ sinh. Đôi khi cần thử thêm một đến hai lần để tìm được kích cỡ phù hợp nhất.

Cách Chăm Sóc

- 1 Tự chăm sóc:** nhiều người học cách **tháo ra, rửa bằng xà phòng và nước, rồi đặt lại** — hàng đêm, hàng tuần hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
- 2 Chăm sóc tại phòng khám:** nếu bạn không tự tháo, bạn sẽ cần **tái khám định kỳ** (thường vài tháng một lần) để bác sĩ vệ sinh và kiểm tra.
- 3** Dù theo cách nào, hãy **tái khám đều đặn** để giữ mô khỏe mạnh.
- 4** Dùng estrogen âm đạo nếu được khuyến nghị để tránh kích ứng.

Những Điều Cần Biết

- Có thể có **tiết dịch** nhất định; tình trạng này có thể kiểm soát được.
- Bạn thường vẫn có thể quan hệ tình dục với vòng nâng dạng vòng đang đặt trong người (một số loại cần tháo trước).

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Đau** vùng chậu, chảy máu mới, hoặc dịch có mùi hôi
- Vòng nâng **tự rơi ra** hoặc bạn **không tháo được**
- Khó đi tiểu hoặc khó đại tiện
- Bỏ lỡ tái khám — vòng nâng để quên có thể gây loét

Nên Biết Thêm

- Có thể thử vòng nâng bất kỳ lúc nào và ngừng bất kỳ lúc nào.
- Đây là lựa chọn tốt nếu bạn muốn tránh hoặc trì hoãn phẫu thuật.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Vòng nâng là thiết bị có thể tháo rời, hỗ trợ sa tạng chậu (một số còn giúp giảm tiểu không kiểm soát khi gắng sức) — an toàn, không phẫu thuật, thường dùng lâu dài.
- Được điều chỉnh kích cỡ tại phòng khám; vòng nâng phù hợp sẽ thoải mái và không tự rơi. Estrogen âm đạo giúp bảo vệ mô.
- Tự chăm sóc hoặc tái khám định kỳ, và không bỏ tái khám. Báo ngay nếu có đau, chảy máu, dịch hôi, hoặc không tháo được vòng nâng.