

Chụp bàng quang-niệu đạo khi đi tiểu (VCUG)

Thông tin cho bệnh nhân · Những điều cần biết trước khi chụp X-quang bàng quang và niệu đạo

WARWIKI

Chụp bàng quang-niệu đạo khi đi tiểu — hay gọi là “VCUG” — là xét nghiệm X-quang chụp ảnh bàng quang và niệu đạo khi bàng quang được bơm đầy thuốc cản quang và trong khi bạn đi tiểu. Xét nghiệm cho thấy bàng quang nạp và tháo nước tiểu như thế nào, giúp nhóm chăm sóc phát hiện các vấn đề như nước tiểu trào ngược lên thận, hẹp hoặc rò rỉ.

Về xét nghiệm này

Bàng quang chứa nước tiểu, và niệu đạo là ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể. VCUG bơm thuốc cản quang vào bàng quang để hiện lên trắng trên X-quang, rồi ghi lại hình ảnh trong khi bạn đi tiểu. Vì xét nghiệm ghi lại bàng quang và niệu đạo *đang hoạt động*, nó có thể thấy những gì ảnh tĩnh không thể hiện được.

Nhóm chăm sóc có thể chỉ định VCUG để:

- Xem bàng quang nạp và tháo nước tiểu như thế nào
- Kiểm tra xem nước tiểu có trào ngược lên thận không (trào ngược bàng quang-niệu quản)
- Quan sát cổ bàng quang và niệu đạo trong khi đi tiểu
- Phát hiện hẹp, rò rỉ, hoặc túi thừa nhỏ (diverticulum)
- Kiểm tra quá trình lành thương sau phẫu thuật bàng quang, tuyến tiền liệt hoặc niệu đạo

Xét nghiệm quan sát đường tiết niệu dưới — bàng quang và niệu đạo. Đây là hình ảnh hỗ trợ điều trị, không phải một phương pháp điều trị.

Có an toàn không?

Có. VCUG là xét nghiệm phổ biến, ít rủi ro. Liều X-quang sử dụng rất nhỏ và thuốc cản quang sẽ được thải ra ngoài theo nước tiểu. Vấn đề thường gặp nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) nhẹ do ống thông — vì vậy kỹ thuật vô khuẩn được áp dụng và đôi khi kháng sinh được cho trước. Khó chịu thoáng qua, nóng rát nhẹ hoặc một ít máu khi đi tiểu sau xét nghiệm thường không đáng kể và sẽ tự hết.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bàng quang

Cơ quan chứa nước tiểu cho đến khi bạn sẵn sàng đi tiểu.

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể.

Ống thông (catheter)

Ống mềm nhỏ để dẫn lưu hoặc bơm đầy bàng quang. Thuốc cản quang có thể đưa vào qua ống bạn đã có sẵn, hoặc qua ống đặt mới qua niệu đạo cho xét nghiệm.

Ống thông bàng quang trên xương mu (SPT)

Ống thông dẫn nước tiểu qua một lỗ nhỏ ở bụng dưới thay vì qua niệu đạo. Nếu bạn đã có ống này, nó có thể được dùng để bơm đầy bàng quang cho xét nghiệm.

Thuốc cản quang

Chất lỏng hiện lên trắng trên X-quang, giúp thấy rõ bàng quang và niệu đạo.

Đi tiểu (void)

Tháo nước tiểu ra ngoài. Các hình ảnh quan trọng nhất được chụp trong khi bạn đi tiểu.

Trào ngược

Khi nước tiểu chảy ngược từ bàng quang lên thận. VCUG có thể phát hiện điều này.

Chiếu X-quang (fluoroscopy)

Loại X-quang cho hình ảnh động trực tiếp khi thuốc cản quang chảy qua.

Hình ảnh sau đi tiểu

Ảnh chụp sau khi bạn đi tiểu xong, để xem bàng quang đã tháo hết chưa.

CÓ ĐAU KHÔNG? Nếu bạn đã có ống thông niệu đạo hoặc ống thông bàng quang trên xương mu, thuốc cản quang được đưa vào qua đó — không cần đặt thêm ống mới. Nếu chưa có, một ống thông mảnh sẽ được đặt qua niệu đạo (có thể cảm thấy tức hoặc nóng rất nhẹ). Việc được yêu cầu đi tiểu trong lúc xét nghiệm là bình thường. Xét nghiệm kéo dài khoảng 30 phút.

Cách chuẩn bị (Trước khi xét nghiệm)

Bạn hầu như không cần chuẩn bị gì nhiều. Trong hầu hết trường hợp:

- Nếu bạn đã có **ống thông niệu đạo hoặc ống thông bàng quang trên xương mu**, hãy giữ nguyên — ống thường được dùng để bơm đầy bàng quang, không cần đặt thêm ống mới.
- Bạn có thể **ăn uống bình thường** và dùng **thuốc thường ngày**, trừ khi nhóm chăm sóc dặn khác.
- Thông thường bạn có thể **tự lái xe về nhà** vì hầu hết người lớn không cần an thần.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Từng có phản ứng với thuốc cản quang X-quang hoặc iodine
- Đang dùng thuốc làm loãng máu
- **Có thể đang mang thai** — X-quang thường được tránh trong thai kỳ
- Có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu (nóng rát, sốt, hoặc nước tiểu đục, mùi nặng) — nhiễm trùng đang hoạt động có thể dẫn đến dời lịch xét nghiệm

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp **mẫu nước tiểu** để kiểm tra nhiễm trùng, và có thể được cho **kháng sinh** để giảm nguy cơ nhiễm trùng nhỏ.

Quá trình xét nghiệm

1. Bạn nằm trên bàn X-quang.
2. **Thuốc cản quang được đưa vào bàng quang.** Nếu bạn đã có **ống thông bàng quang trên xương mu** hoặc **ống thông niệu đạo**, thuốc đưa vào qua đó — **không đặt thêm ống mới**. Nếu chưa có, một ống thông mảnh được đặt qua niệu đạo.
3. Bàng quang được bơm từ từ bằng thuốc cản quang qua ống. Bạn sẽ cảm thấy căng dần, như muốn đi tiểu. Hình ảnh được chụp trong khi bàng quang nạp đầy.
4. Khi bàng quang đầy, bạn sẽ được yêu cầu **đi tiểu trong khi X-quang ghi lại** — đây là phần quan trọng nhất. Ống thông niệu đạo thường được rút trước; ống thông bàng quang trên xương mu có thể được kẹp tạm thời.
5. Một hình ảnh cuối có thể được chụp sau khi bạn đi tiểu xong, để xem bàng quang đã tháo hết chưa.

Sau khi xét nghiệm

- Thông thường bạn có thể về nhà và **sinh hoạt bình thường ngay**.
- Bạn có thể có **nóng rất nhẹ** khi đi tiểu, hoặc một ít **máu hoặc màu hồng** trong một ngày — uống nhiều nước sẽ giúp ích.
- Nếu bạn có **ống thông niệu đạo hoặc ống thông bàng quang trên xương mu**, nhóm chăm sóc sẽ hướng dẫn cách chăm sóc. Thuốc cản quang sẽ được thải ra trong nước tiểu sau vài giờ.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Khó đi tiểu, hoặc không thể đi tiểu được
- Chảy máu nhiều, hoặc máu không cầm
- Đau ngày càng tăng thay vì thuyên giảm

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. VCUG là xét nghiệm X-quang an toàn: bơm thuốc cản quang vào bàng quang và quay phim trong khi bạn đi tiểu — giúp thấy bàng quang và niệu đạo hoạt động ra sao, phát hiện trào ngược lên thận và các vấn đề khác.
2. Chuẩn bị đơn giản: ăn uống và dùng thuốc bình thường — nhưng hãy báo nhóm chăm sóc nếu bạn dị ứng thuốc cản quang, dùng thuốc loãng máu, có thể đang mang thai, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu.
3. Thuốc cản quang đưa vào qua ống thông bạn đã có hoặc qua ống đặt mới cho xét nghiệm; sau đó bạn đi tiểu trong khi được quay phim. Nóng rất nhẹ hoặc một ít máu trong một ngày là bình thường — hãy uống nhiều nước.