

Le traitement par testostérone (TRT) s'adresse aux hommes qui présentent **à la fois** un taux de testostérone confirmé bas **et** des symptômes — tels que baisse du désir sexuel, fatigue, humeur dépressive ou réduction de la masse musculaire et des érections. Il rétablit la testostérone dans une plage normale à l'aide d'un gel, d'une injection, d'un patch ou de granulés implantés. Ce n'est **pas** un traitement « anti-âge » et il n'est pas indiqué pour des taux normaux.

Comment ça fonctionne & À qui s'adresse-t-il

La testostérone basse (hypogonadisme) est diagnostiquée par **deux prises de sang matinales** associées à des symptômes — un seul résultat bas ne suffit pas. Lorsque les deux critères sont réunis, le traitement peut améliorer l'énergie, la libido, l'humeur et la masse musculaire en quelques semaines à quelques mois.

Les formes disponibles

- **Gel ou solution** — appliqué quotidiennement (éviter tout contact cutané avec des femmes et des enfants).
- **Injections** — toutes les 1–2 semaines, ou une forme à action prolongée toutes les ~10 semaines.
- **Patches, granulés implantés** (tous les 3–6 mois), ou un gel nasal.

COMPRENDRE LES TERMES

Testostérone

La principale hormone masculine ; influence la libido, l'énergie, l'humeur et la masse musculaire.

Hypogonadisme

Testostérone basse confirmée.

Hématocrite

Un paramètre sanguin que le TRT peut augmenter — il est surveillé.

PSA

Dosage sanguin prostatique contrôlé avant et pendant le traitement.

Fertilité

Le TRT réduit la production de spermatozoïdes — important si vous souhaitez des enfants.

Transfert de gel

Le gel peut se déposer sur d'autres personnes — couvrez la zone et lavez-vous les mains.

VOUS PRÉVOYEZ D'AVOIR DES ENFANTS ? Informez votre équipe avant tout. Le TRT **réduit la production de spermatozoïdes et peut provoquer une infertilité** — parfois durable. Si la fertilité est importante pour vous, d'autres traitements peuvent élever la testostérone tout en préservant les spermatozoïdes. Ne commencez pas le TRT sans en avoir discuté.

Surveillance (Important)

Le TRT nécessite des contrôles réguliers et des prises de sang :

- **Taux de testostérone** — pour confirmer que vous êtes dans la plage normale.
- **Hématocrite** — le TRT peut épaissir le sang ; si le taux est trop élevé, la dose est ajustée ou suspendue.
- **PSA / prostate** — contrôlés avant et pendant le traitement ; le TRT n'est pas initié en cas de cancer de la prostate non traité.

Utiliser le traitement en toute sécurité

- **Gel** : appliquez selon les instructions, laissez sécher, couvrez la zone et lavez-vous les mains — évitez le transfert vers les femmes et les enfants.
- Ne modifiez pas vous-même votre dose ; respectez tous vos rendez-vous de laboratoire.
- Signalez à votre équipe toute maladie cardiaque ou **apnée du sommeil** (le TRT peut l'aggraver).

Effets fréquents

- Acné, peau grasse, rétention d'eau
- Sensibilité mammaire ; testicules plus petits ; fertilité réduite
- Augmentation des globules rouges (peut nécessiter une surveillance ou une saignée)

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Douleur thoracique, gonflement ou douleur dans les jambes, ou essoufflement
- Maux de tête sévères, troubles visuels ou symptômes de sang trop épais
- Nouveaux troubles urinaires ou préoccupations prostatiques

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le TRT est réservé aux hommes ayant une **testostérone basse confirmée avec symptômes** — pas pour des taux normaux ni comme traitement anti-âge.
2. Il **réduit la fertilité** — informez votre équipe avant de commencer si vous envisagez d'avoir des enfants.
3. Il nécessite une surveillance régulière (testostérone, numération sanguine, prostate). Avec les gels, évitez le transfert sur d'autres personnes.