

Injection d'agent comblant péri-urétral

WARWIKI

Information pour le patient · Un geste en consultation pour l'incontinence urinaire d'effort

L'injection d'agent comblant péri-urétral est un traitement peu invasif de l'**incontinence urinaire d'effort** — les fuites lors de la toux, du rire ou de l'activité physique. Un matériau souple est injecté autour de l'urètre pour aider à son occlusion, afin que moins d'urine s'échappe lors d'une augmentation de pression. Le geste est rapide, ne nécessite aucune incision, et peut être une alternative ou une étape avant une bandelette chirurgicale (sling).

Comment ça fonctionne

L'agent comblant est placé dans la paroi de l'urètre en quelques points, **le rembourrent** pour que le canal se ferme plus complètement. Avec un urètre mieux occlus, les augmentations soudaines de pression abdominale ont moins de chances de provoquer des fuites.

Est-ce adapté à ma situation ?

- Un bon choix si vous souhaitez un traitement **rapide et à faible risque** sans chirurgie
- Utile pour celles et ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'une bandelette, ou préfèrent l'éviter
- Peut servir de **solution transitoire** avant de décider d'une intervention chirurgicale

L'effet est généralement **moins durable** que celui d'une bandelette et peut ne pas corriger totalement les fuites, mais l'injection peut être **répétée** si l'effet s'estompe.

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence d'effort

Fuite avec pression — toux, rire, port de charge, exercice.

Agent comblant

Le matériau souple injecté pour rembourrer la paroi de l'urètre.

Urètre

Le canal qui évacue l'urine hors du corps.

Cystoscope

La fine caméra utilisée pour guider l'injection.

Bandelette (sling)

Un support chirurgical sous l'urètre — une alternative plus durable.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Il s'agit habituellement d'un **geste en consultation sous anesthésie locale**, qui dure environ 10–15 minutes. La plupart des personnes ne ressentent qu'une légère pression et rentrent chez elles le jour même, reprenant rapidement leurs activités normales. Une brève sensation de brûlure après le geste est fréquente.

Comment vous préparer

- Un **examen d'urine** pour exclure une infection avant le geste
- Signalez à votre équipe soignante les **anticoagulants** et toute allergie
- Aucune préparation importante — vous pouvez généralement rentrer seul(e)

Déroulement

- 1 Un anesthésique local est appliqué.
- 2 Un fin **cystoscope** est introduit pour visualiser l'urètre.
- 3 L'agent comblant est injecté en quelques points autour de l'urètre.
- 4 Le cystoscope est retiré ; vous videz votre vessie avant de partir.

Après

- Une légère brûlure, une urgenterie ou un peu de sang dans les urines pendant un ou deux jours est normal.
- Vous pourriez avoir **temporairement du mal à uriner** juste après — en général de courte durée.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Vous **ne pouvez pas uriner** après le geste
- Fièvre ou frissons (possible infection)
- Saignement important ou douleur qui s'aggrave

Bon à savoir

- L'effet complet s'observe en quelques semaines.
- Si les fuites réapparaissent avec le temps, l'injection peut être **répétée**.
- Une bandelette reste envisageable plus tard si vous souhaitez un résultat plus durable.

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'injection d'agent comblant est un geste rapide sans incision qui aide l'urètre à se fermer, réduisant les fuites d'effort.
2. Elle est moins durable qu'une bandelette et peut ne pas corriger totalement les fuites, mais elle est peu risquée et reproductible.
3. La récupération est rapide. Appelez si vous ne pouvez pas uriner ou si vous avez de la fièvre après le geste.