

5-Alpha 還原酶抑制劑（縮小前列腺藥丸）

WARWIKI

病人須知 · 逐漸縮小前列腺增生嘅藥丸

5-alpha 還原酶抑制劑係一種藥丸，可以慢慢縮小前列腺增生（BPH），改善排尿，並長遠降低尿道閉塞同埋需要手術嘅風險。呢類藥有兩種：finasteride（Proscar）同埋dutasteride（Avodart）。效果係慢慢顯現嘅——要等幾個月先見效。

點樣運作

呢啲藥丸阻止身體將睪固酮轉化成DHT——就係促使前列腺增大嘅荷爾蒙。DHT 少咗，前列腺就會慢慢縮細，令尿道通道變闊。因為縮小需要時間，完整效果要等**3-6 個月**先出現——呢隻藥唔係即時見效嘅，通常會配合快效嘅 alpha 阻滯劑一齊用。

會點樣

- 最適合**前列腺較大**嘅患者；效果慢慢積累。
- **每日一次**，需要長期服用。
- 長遠可降低**尿瀦留**同埋需要前列腺手術嘅風險。

詞彙解釋

5-ARI

5-alpha 還原酶抑制劑（finasteride、dutasteride）。

BPH

良性前列腺增生——即前列腺肥大。

DHT

促使前列腺增大嘅荷爾蒙；呢隻藥會降低 DHT。

PSA

前列腺血液測試；呢隻藥會令數值下降約一半。

尿瀦留

無法排空膀胱——長期服藥可降低此風險。

Finasteride / dutasteride

呢類藥嘅兩種藥物。

會影響你嘅 PSA 測試 呢隻藥會令你嘅 PSA 血液數值下降約一半。呢個對你無害，但醫生需要知道，以便正確解讀前列腺癌篩查結果 — 一般會將 PSA 數值乘以二再作比較。請確保每位醫護人員都知道你正在服用呢隻藥。

點樣食

- 每日一次，盡量固定時間服用；要有耐心 — 效果需要幾個月先顯現。
- 初期感覺唔到變化唔好就停藥。
- 通常需要長期服用，以保持前列腺縮細。

重要安全須知

- 懷孕嘅女士唔可以接觸壓碎或破損嘅藥片（對男性胎兒有風險）；完整有薄膜包衣嘅藥片接觸係安全嘅。
- 服藥期間及停藥後一段時間內唔可以捐血。
- 如有情緒變化或抑鬱症狀，請告知醫療團隊。

常見副作用

- 性慾下降、勃起困難或射精量減少
- 乳房觸痛或增大
- 部分男士反映性功能影響持續 — 有任何疑慮請與醫生傾

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 乳房有硬塊、疼痛或乳頭分泌物
- 新出現嘅抑鬱或情緒變化
- 完全無法排尿（請即刻求醫）

要記住嘅三件事

1. 5-ARI 慢慢縮小前列腺，改善排尿並降低尿瀦留同手術風險 — 要等 3–6 個月。
2. 呢隻藥會令 PSA 數值下降約一半 — 確保醫生睇篩查前列腺癌時將此計算在內。
3. 懷孕女士唔可接觸破損藥片，服藥期間唔可捐血。如有乳房變化或新出現抑鬱，請告知醫生。