

後天性隱藏陰莖 & 修復手術

WARWIKI

病人須知 · 當陰莖被隱藏起嚟，以及手術點樣令佢恢復正常

後天性隱藏陰莖係指成年後陰莖被下腹、陰囊或大腿嘅皮膚同脂肪遮蓋嘅情況。呢個問題可以引致衛生困難、反覆皮膚感染、企立小便困難，以及影響性生活。呢係一個公認、可以治療嘅重建問題 — 手術可以令陰莖重新外露並恢復正常功能。

關於呢個病

“後天性”即係喺成年後先出現（唔同於小童嘅隱藏陰莖，後者通常係無害嘅）。常見成因包括體重增加及下腹厚厚嘅脂肪墊、之前割包皮或手術留低嘅疤痕、慢性皮膚腫脹（**淋巴水腫**），以及一種名為**扁平苔蘚（硬化性）**嘅疤痕性皮膚病。

呢個情況往往形成惡性循環：

- 被困嘅皮膚長期潮濕，容易發炎同感染。
- 小便濺到被困嘅皮膚，令刺激同疤痕更嚴重。
- 衛生護理、排尿同性生活會隨時間愈來愈困難。

點解修復手術有幫助

手術目標係釋放陰莖、切除病變皮膚，並重建健康皮膚覆蓋，令你企立小便、保持清潔，並恢復正常生活 — 手術後滿意度普遍偏高。

詞彙解釋

隱藏陰莖

陰莖被周圍皮膚及脂肪遮蓋。

腹部脂肪切除術（Panniculectomy）

切除下腹垂墜嘅脂肪及皮膚圍裙。

恥骨脂肪切除術（Escutcheonectomy）

切除陰莖正上方嘅脂肪墊。

皮膚移植（Skin graft）

將健康皮膚移植去覆蓋陰莖軸。

扁平苔蘚（硬化性）

可引起或加重隱藏陰莖嘅疤痕性皮膚病。

淋巴水腫（Lymphedema）

慢性皮膚腫脹，可令陰莖被埋藏。

我係咪要先減肥先做手術？ 通常係 — 如果係體重相關嘅隱藏陰莖，減重（有時需要轉介肥胖科）可以改善手術效果同持久性，所以醫療團隊可能建議你喺手術前或同時減重。修復手術本身通常會**同時切除脂肪墊**。

手術點樣做

- 1 陰莖從疤痕同周圍組織中**釋放出嚟**。
- 2 切除病變或疤痕化嘅皮膚；陰莖軸通常以**皮膚移植**重新覆蓋。
- 3 切除垂墜嘅脂肪墊或皮膚圍裙（**腹部脂肪切除術 / 恥骨脂肪切除術**）；陰囊可能需要整形。
- 4 有時需要**分期**進行；術後會放置尿管及引流管。

點樣準備

- **控制體重**（可能需要轉介肥胖科）並**戒煙** — 兩者對傷口癒合影響好大。
- 先處理任何活躍皮膚感染；遵從麻醉前指示。
- 安排家中有人照顧及請假休養 — 康復需要一段時間。

之後

- 預期需要**住院**，並帶著尿管及引流管一段時間。
- 如果用咗皮膚移植，要**保護移植位置** — 按照指示避免坐喺或施壓喺該處。
- 做好傷口護理，逐漸恢復活動；控制體重有助維持手術效果。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒、紅腫蔓延或有異味分泌物（感染）
- 移植皮膚或傷口變**深色**、裂開或大量出血
- 你**唔能夠排尿**，或尿管停止引流

要記住嘅三件事

1. 後天性隱藏陰莖係陰莖被皮膚及脂肪遮蓋，引致衛生、排尿、感染同性生活問題 — 而且係可以修復嘅。
2. 修復手術釋放陰莖、切除病變皮膚（通常用皮膚移植），並切除脂肪墊；可能需要分期進行。
3. 減重同戒煙可大大改善效果。如出現發燒、移植皮膚變色或排尿困難，請即刻聯絡醫療團隊。