

ACT 可調節氣球（女性用）

WARWIKI

病人須知 · 兩個可調節氣球，支撐尿道以改善壓力性漏尿

ACT（可調節控尿治療，Adjustable Continence Therapy）係一種細小嘅可調節植入物，專為有壓力性尿失禁（SUI）嘅女性而設——即係喺咳嗽、大笑、搬重物或做運動時漏尿。兩個細小嘅矽膠氣球會放喺尿道兩側、靠近膀胱頸嘅位置，輕柔地支撐尿道，改善控尿能力。同男性版本（ProACT）一樣，氣球可以喺術後喺診所微調。

點樣運作

壓力性漏尿係因為尿道下方嘅支撐力同閉合壓力不足所致。兩個氣球會喺尿道兩側提供輕柔、可調節嘅支撐，令尿道喺用力時保持閉合——唔會完全箍緊尿道。每個氣球連接一個埋喺陰唇皮膚下嘅細小**注射口**，醫生透過呢個口調整氣球嘅充液量。

適唔適合我？

- 係**壓力性尿失禁（SUI）**嘅一種選擇，常用於之前嘅控尿手術效果唔理想，或者閉合肌肉較弱（ISD）嘅情況
- 適合想要微創、**可調節、可逆**方案嘅人
- **供應因地區而異**——只係部分專科中心提供，並非所有地方都有；請問你嘅醫生當地係咪有得做
- 主要由**盆腔器官脫垂**或**膀胱過度活躍症（OAB）**引起嘅漏尿，效果相對較差

詞彙解釋

壓力性尿失禁

咳嗽、大笑、搬重物或做運動時漏尿。

膀胱頸

膀胱連接尿道（排尿管道）嘅位置。

氣球

細小嘅矽膠氣球，提供輕柔、可調節嘅支撐。

注射口

埋喺陰唇皮膚下嘅細小閥門，用嚟調節氣球。

微調（Titration）

分幾次診症逐步調整氣球液量。

ISD

尿道內括約肌功能不足——閉合肌肉較弱。

會唔會痛？ 氣球係喺**短暫手術**下放置，採用麻醉（全身麻醉、脊椎麻醉，或局部麻醉加鎮靜），通常係**日間手術**，喺陰道開口旁邊以細小穿刺口進行——唔需要大切口。術後幾日可能有輕微酸痛同腫脹。其後喺診所做嘅調整快捷，只需喺注射口用細針注射。

點樣做

- 1 喺麻醉下，醫生以**X光或超聲波**引導，透過陰道開口旁邊嘅細小穿刺口，將一個氣球放喺尿道**每一側**、靠近膀胱頸嘅位置。
- 2 連接管引至陰唇皮膚下嘅**兩個注射口**。
- 3 氣球初時幾乎係空嘅，等傷口癒合。

調整裝置

- 幾個星期後，醫療團隊會喺**診所**透過陰唇注射口注入少量液體——快捷注射，唔需要手術。
- 分幾次覆診調整，直至控尿良好而**唔影響排尿**。
- 可隨時加液或減液；如有需要，整個裝置可以**取出**。

之後

- 術後幾日可能有輕微酸痛、腫脹或瘀青；短期內避免搬重物及劇烈運動。
- 隨著氣球逐步調整，漏尿會**慢慢改善**——唔一定即時見效。
- 日後如有手術或影像檢查，請告知醫療人員你有呢個植入物。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **排尿困難**或完全排唔到尿（可能係氣球太滿或腫脹所致）
- 發燒、痛楚加劇、傷口位置紅腫或有分泌物（可能係感染）
- 陰道新出現不適或分泌物，或小便有血（可能係侵蝕）

要記住嘅三件事

1. ACT 以兩個可調節氣球支撐尿道、減少壓力性漏尿——微創且可逆。
2. 透過細小穿刺口放置，其後喺診所分幾次透過陰唇注射口微調。
3. 常用於反覆漏尿或括約肌較弱嘅情況；供應因地區而異——如排唔到尿或有感染跡象，請即刻聯絡醫生。