

甲型阻斷劑（用於前列腺／排尿問題）

WARWIKI

病人須知 · 幫助放鬆出口肌肉、改善排尿嘅藥物

甲型阻斷劑係一種藥丸，能夠放鬆前列腺同膀胱頸嘅肌肉，令排尿更暢順 — 係治療良性前列腺增生 (BPH) 排尿症狀嘅第一線藥物。常見嘅包括 tamsulosin (Flomax)、alfuzosin、silodosin、doxazosin 同 terazosin。呢啲藥起效快，但唔會縮細前列腺。

點樣運作

前列腺增大會壓迫尿道。甲型阻斷劑放鬆膀胱出口嘅肌肉，令尿流更有力，減少排尿遲疑、用力同斷斷續續嘅情況。呢啲藥係治療症狀 — 唔會改變前列腺大細，所以要繼續食先有效果。

會點樣

- 通常**好快**就有改善 — 幾日至一兩個星期內。
- 一般**每日一次**；tamsulosin 要喺**同一餐後約 30 分鐘**服用。
- Doxazosin／terazosin 要**睡前**開始服用，再慢慢加量，減少頭暈。
- 如前列腺較大，可以配合縮前列腺嘅藥一齊服用。

詞彙解釋

甲型阻斷劑

放鬆膀胱出口肌肉嘅藥丸。

BPH

良性前列腺增生 — 即前列腺良性變大。

膀胱頸

膀胱連接尿道嘅肌肉出口。

逆行射精

精液倒流入膀胱 — 無害，但射精量會減少甚至無液體。

體位性低血壓

站起身時因血壓下降而感到頭暈。

IFIS

白內障手術時虹膜鬆弛效應 — 請告知你嘅眼科醫生。

即將做白內障手術？ 請告知你嘅眼科醫生你有服用（或曾經服用）甲型阻斷劑 — 呢隻藥可能令手術期間虹膜變得鬆弛（IFIS），醫生會預先計劃應對。**即使已經停藥**，呢點仍然重要。

點樣食

- 每日**同一時間**按指示服藥（tamsulosin 係飯後約 30 分鐘服用）。
- 服用 doxazosin／terazosin 時，**第一劑睡前食**，起身時要慢慢站起 — 初服時血壓可能會下降引致頭暈。
- 漏咗一劑唔好即時補雙份。

重要安全須知

- 尤其係初期，站起身時要**慢慢郁**，避免頭暈或暈倒。
- 與 **PDE5 抑制劑**或血壓藥一齊服用時要小心（加重頭暈）。
- **逆行射精**（射精量減少或無液體）係服用 tamsulosin／silodosin 時常見 — 無害，停藥後會恢復。

常見副作用

- 頭暈或頭重腳輕；疲勞
- 鼻塞
- 射精量減少或「乾射」

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 暈倒或嚴重頭暈
- 心跳加速或心悸，或胸痛
- **完全排唔到尿**（盡快求醫）

要記住嘅三件事

1. 甲型阻斷劑快速放鬆膀胱出口，改善 BPH 排尿 — 係緩解症狀，唔係縮細前列腺。
2. 初期站起身要慢，射精量減少係常見且無害嘅副作用。
3. 做白內障手術前，一定要告知**眼科醫生**你有服用或曾服用甲型阻斷劑。