

抗膽鹼藥（用於膀胱過度活躍症）

WARWIKI

病人須知 · 幫膀胱減少過早收縮嘅藥丸

抗膽鹼藥（又叫抗毒蕈鹼藥）係用嚟平息膀胱過度活躍症（OAB）嘅藥，可以減少突然尿急、頻繁去廁所同尿急性失禁。常見嘅有 oxybutynin、tolterodine、solifenacin、fesoterodine、darifenacin 同 trospium（oxybutynin 亦有貼片或啫喱劑型）。呢類藥已用咗好多年，療效有保證。

點樣運作

呢類藥會阻截令膀胱收縮嘅訊號，令膀胱喺儲尿期間收縮得少啲、唔係咁急。結果係尿急減少、去廁所次數減少。服藥期間會見到效果，通常需要幾個星期先充分發揮。

會點樣

- 通常需要幾個星期先見效 — 唔好太早放棄。
- 大多數緩釋劑型係每日一次服用。
- 緩釋藥丸、貼片或啫喱比短效 oxybutynin 引起口乾嘅機會少。

詞彙解釋

膀胱過度活躍症 (OAB)

膀胱過早收縮引起嘅尿急同頻尿。

抗膽鹼藥 / 抗毒蕈鹼藥

用嚟平息膀胱肌肉嘅一類藥。

口乾

最常見嘅副作用。

抗膽鹼負擔

同時服用多種同類藥嘅累積效應 — 老年人要特別注意。

Beta-3 受體激動劑

另一種 OAB 藥，副作用較少（可作替代）。

窄角型青光眼

患呢種眼病嘅人通常要避免使用呢類藥。

老年人須知 對老年人嚟講，呢類藥可能影響**記憶力同思考能力**，長期服用多種抗膽鹼藥亦有可能令認知功能下降。如果你有呢方面嘅顧慮，可以問醫療團隊考慮改用 **beta-3 受體激動劑**，呢種 OAB 藥冇呢個問題。

點樣食

- 按指示**每日一次**服藥；尿急未完全改善唔好自行停藥。
- 如果口乾令你唔舒服，可以問醫生換**緩釋劑型、貼片或啫喱**。
- 配合膀胱訓練同盆底運動（凱格爾運動），效果會更好。

重要安全須知

- 有**未經治療嘅窄角型青光眼**嘅人通常唔宜用 — 請告知醫療團隊你嘅眼科情況。
- 如果你有**排尿困難**、嚴重便秘或某些腸胃問題，要小心使用。
- 呢類藥會減少排汗 — **天氣熱時**要注意唔好中暑。

常見副作用

- 口乾同便秘**（最常見）
- 視力模糊、眼睛乾澀
- 睏倦；老年人可能出現混亂

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 你**完全唔能夠小便**，或者感覺排唔乾淨
- 出現**新嘅記憶或思考問題**，尤其係老年人
- 嚴重便秘，或眼痛 / 眼紅伴視力模糊

要記住嘅三件事

- 抗膽鹼藥可以平息 OAB，減少尿急、頻尿同尿急性失禁；要等幾個星期先見效。
- 口乾同便秘係常見副作用 — 緩釋劑型、貼片或啫喱可以減輕。
- 老年人可能影響思考；beta-3 受體激動劑係替代選擇。唔能夠排尿或出現新嘅混亂，請即刻聯絡醫療團隊。