

Beta-3 受體促效劑（治療膀胱過度活躍症）

WARWIKI

病人須知 · 一種較新嘅膀胱藥，口乾副作用較少

Beta-3 受體促效劑係一類較新嘅口服藥，用於治療膀胱過度活躍症 (OAB) — 即尿急、頻繁去廁所同急迫性漏尿。呢類藥令膀胱放鬆，儲尿量增加，而且比舊式抗膽鹼藥引起嘅口乾、便秘同記憶問題少好多。現有兩種藥：mirabegron (Myrbetriq) 同 vibegron (Gemtesa)。

點樣運作

呢類藥激活膀胱壁嘅 **beta-3 受體**，令膀胱肌肉放鬆，儲尿期間更加平靜。咁樣尿急次數同去廁所次數就會減少 — 其作用途徑同抗膽鹼藥唔同。

會點樣

- 藥效需要幾個星期才完全顯現；每日服一次。
- 一般耐受性良好 — 幾乎唔會口乾。
- 適合長者或曾因抗膽鹼藥出現口乾等副作用嘅患者。
- 頑固症狀時可與抗膽鹼藥合用。

詞彙解釋

膀胱過度活躍症 (OAB)

膀胱過早收縮引起嘅尿急同尿頻。

Beta-3 受體促效劑

透過 beta-3 受體令膀胱放鬆嘅口服藥。

Mirabegron / vibegron

呢類藥嘅兩種藥物。

抗膽鹼藥

舊式 OAB 口服藥；beta-3 受體促效劑可避免其多種副作用。

血壓

Mirabegron 可能令血壓輕微上升，需要監測。

點解揀呢類藥而唔係舊式藥？ Beta-3 受體促效劑治療 OAB 嘅效果同抗膽鹼藥差唔多，但**口乾同便秘少好多**，亦唔會影響記憶 — 因此通常更受歡迎，尤其係長者。主要需要留意嘅係血壓。

點樣食

- 按指示**每日服一次**；需要幾個星期才見效。
- 配合膀胱訓練同盆底運動（凱格爾運動），效果更佳。
- 定期覆診，讓醫療團隊評估效果同監測血壓。

重要安全須知

- **Mirabegron 可能令血壓上升** — 需定期監測；如果你嘅血壓嚴重偏高或控制唔穩定，唔應該用呢隻藥。（Vibegron 對血壓影響極微。）
- 告知醫療團隊你正在服用嘅其他藥物 — mirabegron 可能影響某些藥物嘅濃度。
- 如服藥後排尿困難，請告知醫療團隊。

常見副作用

- 通常較輕微 — 頭痛、鼻塞
- 血壓上升（主要係 mirabegron）
- 尿道感染或輕微便秘

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 血壓嚴重偏高或劇烈頭痛
- 完全唔能夠小便或感覺排唔清
- 面部、嘴唇或舌頭腫脹，或呼吸困難（罕見過敏反應） — 請立即求急診

要記住嘅三件事

1. Beta-3 受體促效劑令膀胱放鬆，改善 OAB 症狀，比舊式藥**口乾少好多**。
2. 適合長者或曾有抗膽鹼藥副作用嘅患者；需要幾個星期先見效。
3. Mirabegron 可能令血壓上升 — 記得定期覆診。如唔能夠小便或血壓急升，請即聯絡醫療團隊。