

# 膀胱 Botox（控制膀胱）

病人須知 · 用注射嘅方式令膀胱過度活躍症平靜返

WARWIKI

**膀胱 Botox 係用嚟治療膀胱過度活躍症 (OAB) 嘅療程 — 症狀包括尿急、頻密去廁所同埋急迫性尿失禁 — 適合生活習慣改善同藥物治療效果唔夠理想嘅患者。醫生會用細細嘅鏡經尿道將少量肉毒桿菌毒素 (Botox) 注入膀胱肌肉，令佢放鬆。藥效約喺 1-2 星期後出現，一般持續約 6 個月。**

## 點樣運作

膀胱過度活躍係因為膀胱肌肉喺唔應該收縮嘅時候收縮咗。Botox **令膀胱肌肉放鬆**，阻止佢不受控地收縮 — 從而減輕尿急、尿頻同急迫性漏尿。藥效唔係即時嘅；你會喺 **1-2 星期**後先感覺到改善。

## 安唔安全？

係，呢個療程已有充足臨床根據。最重要嘅係，Botox 令膀胱放鬆後，有時會令膀胱**較難完全排空** — 少數人需要暫時進行**自我導尿**直至藥效退去。因此，你需要願意並有能力學習自我導尿以備不時之需。其他副作用包括尿道感染同短暫出現小便有血。

### 詞彙解釋

#### 膀胱過度活躍症

膀胱太早收縮，引致尿急同尿頻。

#### 肉毒桿菌毒素 (Botox)

注射後可令肌肉放鬆嘅藥物。

#### 逼尿肌

被注射嘅膀胱肌肉。

#### 膀胱鏡

用嚟輸送注射藥物嘅細型攝影鏡。

#### 自我導尿

用細管自行排空膀胱，有時需要暫時使用。

#### 排尿後餘尿

排尿後膀胱仍殘留嘅尿液，手術後會檢查。

**會唔會痛？** 醫生會先喺膀胱放入麻醉藥，所以大部分人喺注射期間只會感覺到輕微壓力。呢個通常係**局部麻醉**下喺診所進行嘅程序，約需 10–15 分鐘，做完即可回家。

## 點樣準備

- 事前進行**尿液測試**，排除感染。
- 程序前後可能會處方**抗生素**。
- 告知醫療團隊你有否服用**薄血藥**，並預備學習自我導尿以備萬一。

## 會發生咩事

- 1 將麻醉藥注入膀胱。
- 2 將細型**膀胱鏡**經尿道放入。
- 3 喺膀胱壁多個位置注射 Botox。
- 4 移除膀胱鏡 — 整個程序約需 10–15 分鐘。

## 之後

- 小便輕微灼痛或有少量血絲，持續一兩日係正常嘅。
- 藥效喺 1–2 星期後逐漸顯現；效果持續約 6 個月，可以**重複**注射。

### 如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 你**完全唔能夠小便**，或感覺排唔清
- 發燒或畏寒（可能係感染）
- 尿液大量出血或有血塊
- 灼痛喺幾日後加劇

## 其他資訊

- 程序後通常會**檢查**你嘅排尿餘量。
- 如需重複注射，每次相隔數個月。

### 要記住嘅三件事

1. 膀胱 Botox 令過度活躍嘅膀胱肌肉放鬆，減輕尿急、尿頻同急迫性漏尿；藥效喺 1–2 星期後出現，持續約 6 個月。
2. 呢係喺診所局部麻醉下進行嘅快速程序；主要取捨係少數人需要暫時自我導尿。
3. 如果程序後唔能夠小便或出現發燒，請即刻致電求助。