

Colpocleisis（陰道閉合手術）

WARWIKI

病人須知 · 一種簡單、持久嘅盆腔器官脫垂修復手術，透過閉合陰道來固定器官

Colpocleisis 係一種非常有效、對身體負擔小嘅盆腔器官脫垂手術，透過閉合大部分陰道管道，將器官永久托住。因為手術會封閉陰道，所以只適合確定唔再需要陰道性交嘅人士。手術快、創傷小、成功率高 — 對年長或有其他健康問題嘅人士尤其係一個好選擇。

關於呢個手術

Colpocleisis 唔係重建支撐，而係**切除一條陰道黏膜，然後將前後壁縫合埋一齊**，令陰道管道縮短閉合，器官就唔會再脫出嚟。手術可以喺子宮仍在嘅情況下做，亦可以喺切除子宮之後進行。因為唔需要長時間重建，手術更快、風險更低，成功率超過 **90%**。

重要決定

最關鍵嘅一點係：Colpocleisis 之後，**陰道性交將永久唔再可能**。對於確定接受呢點嘅人，滿意度非常高。你嘅醫療團隊會確保呢個選擇啱你，並排除其他顧慮（例如需要先評估子宮嘅情況）先至進行手術。

詞彙解釋

盆腔器官脫垂

盆腔器官下移，造成突出或下墜感。

Colpocleisis

閉合大部分陰道管道嚟托住器官嘅手術。

閉合式修復手術

透過閉合（而非重建）陰道來修復脫垂。

LeFort 手術

子宮仍在時進行嘅一種 Colpocleisis 術式。

吊帶 (Sling)

有時同步加裝，用嚟處理尿失禁。

會唔會痛？ 手術會喺麻醉（通常係脊椎麻醉或全身麻醉）下進行，過程中唔會感到痛楚，而且手術時間通常較短。術後大多數人只有輕微不適，恢復快 — 係各種脫垂手術中最易復原嘅之一。

點樣準備

- 確定自己**願意接受**術後唔再有陰道性交呢個決定。
- 跟從**麻醉指示**（禁食、按醫囑暫停薄血藥）。
- 術前評估；如果你同時有漏尿問題，或需要**同步加裝吊帶**。
- 安排人接送及術後在家協助。

會發生咩事

- 1 你會喺麻醉下進行手術，並會預防性使用抗生素。
- 2 切除陰道黏膜條，然後將前後壁**縫合埋一齊**，閉合陰道管道。
- 3 短暫放置尿管，有時會放陰道填塞物。

之後

- 通常**當日或住院一晚**；恢復輕鬆。
- 短暫帶住尿管；少量滲血係正常嘅。
- 數個星期內**避免用力提重物**；需處理便秘問題。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 大量出血
- 拔除尿管後**唔能夠排尿**
- 盆腔痛加劇

要記住嘅三件事

1. Colpocleisis 閉合大部分陰道嚟托住脫垂器官 — 手術快、效果持久，係追求簡單低風險修復嘅好選擇。
2. 取捨係永久性嘅：**陰道性交將永遠唔再可能** — 只適合對此確定嘅人。
3. 恢復通常輕鬆。避免用力，如有發燒、大量出血或排尿困難請即聯絡醫療團隊。