

瘻管 — 泌尿生殖系統及直腸陰道

病人須知 · 異常通道導致尿液、氣體或大便滲漏

WARWIKI

瘻管係器官之間出現嘅異常小通道，令兩個本不相連嘅器官連埋一齊。喺盆腔，佢可以喺膀胱（或輸尿管／尿道）同陰道之間形成—引致尿液不斷滲漏—或者喺直腸同陰道之間形成—令氣體或大便經陰道排出。瘻管自行愈合嘅機會唔大，但係可以修補返。

關於呢個病

- **泌尿生殖系統瘻管**（如膀胱陰道瘻）— 日夜持續、不受控制地由陰道漏尿。
- **直腸陰道瘻管** — 氣體或大便經陰道排出，反覆感染，皮膚受刺激。

呢啲症狀可以好困擾、令人孤立無援—但佢係一個「管道」嘅問題，有「管道」嘅解決方法，唔係你做錯咗咩。

成因

- **盆腔或婦科手術**（如子宮切除術）— 喺唔少地方係最常見成因
- **分娩** — 尤其係長時間、難產（係全球主要成因之一）
- **放射治療**、炎症性腸病、感染，或（較少見）癌症

詞彙解釋

瘻管

連接兩個器官嘅異常通道。

膀胱陰道瘻

膀胱同陰道之間嘅瘻管。

直腸陰道瘻

直腸同陰道之間嘅瘻管。

染料測試

將有色液體注入膀胱或直腸，找出滲漏位置。

膀胱鏡檢查

用內窺鏡睇膀胱內部，找到開口。

Martius 皮瓣

用於加固修補嘅組織瓣。

改道手術

暫時改變尿液或大便走向，讓傷口愈合。

可以修好嗎？ 係一大多數瘻管都可以修補，好多人可以完全康復。有時細小而新鮮嘅瘻管靠留置尿管數星期就會自行閉合，但大多數需要安排手術。時機好重要：外科醫生通常等炎症消退後先做手術，成功率先最高。

點樣診斷

- 體格檢查，通常配合**染料測試**確定滲漏位置
- **膀胱鏡檢查**及影像檢查，了解大小、位置及成因
- 排查有無相關病因（放射損傷、感染、炎症性腸病）

點樣治療

- 1 **保守治療** — 細小而新發嘅尿道瘻管，可嘗試留置尿管數星期令其自行閉合。
- 2 **手術修補** — 經陰道或腹部切口，分層封閉瘻管通道。
- 3 **組織瓣** — 用健康組織（如 Martius 皮瓣）加固修補，放射治療後尤其需要。
- 4 **暫時改道** — 部分直腸陰道瘻管需暫時改變大便走向，讓修補位置愈合。

注意事項

- 等候手術期間，保護皮膚並使用護墊；醫療團隊可以幫你減輕不適。
- **放射治療後**嘅修補較複雜，通常需要組織瓣。
- 術後可能需要留置尿管，並接受**癒合測試**，確認後先拔除。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒，或盆腔疼痛加劇
- 出現感染徵兆，或大量出血
- 術後：尿管停止引流，或滲漏再次出現

要記住嘅三件事

1. 瘻管係異常通道，引致漏尿（泌尿生殖系統瘻）或氣體／大便經陰道排出（直腸陰道瘻）。
2. 大多數都可以修補一少數細小嘅靠尿管閉合，但大部分需要安排手術，有時需要組織瓣。
3. 時機好重要；醫療團隊可能等炎症消退後先做。術後如有發燒、感染徵兆或滲漏再現，請即刻聯絡。